

Ueber
die Amidine der Kohlensäure.

Als
Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
genehmigt von der
hohen philosophischen Fakultät
der
kgl. Ludwig-Maximilians-Universität München.

Vorgelegt von
Richard Löwenthal
aus Schwerin in Mecklenburg.

München, 1883.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Ueber
die Amidine der Kohlensäure.

Als
Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
genehmigt von der
hohen philosophischen Fakultät
der
kgl. Ludwig-Maximilians-Universität München.

Vorgelegt von
Richard Löwenthal
aus Schwerin in Mecklenburg.

München, 1883.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

I.

Theoretischer Theil.

Wenn man die Entwicklung der organischen Chemie betrachtet, so kann man leicht die Beobachtung machen, daß unsere Kenntnisse der Sauerstoffverbindungen, besonders in der Fettreihe, meist älter sind, als die der entsprechenden des Stickstoffs.

Während zum Beispiel der Aethylalkohol, ein Oxyd des Aethans, schon dem Arnold von Villanova (zu Montpellier um 1300) bekannt war und der deutsche Arzt Valerus Cordus 1540 den gewöhnlichen Aether, ein anderes Oxyd des Aethans, als »oleum vini dulce« beschrieb, und der Methylalkohol, ein Oxyd des einfachsten Kohlenwasserstoffs, des Methans, im Jahre 1812 aufgefunden wurde, sind die entsprechenden Ammoniakderivate, das Aethyl- und Methylamin u. a. m., erst im Jahre 1849 (von Wurtz und fast gleichzeitig von A. W. Hofmann) entdeckt. Andere correspondirende Stickstoffverbindungen sind bekanntlich noch viel später dargestellt. In der aromatischen Reihe liegt die Sache zwar vielfach anders, da die leicht zu gewinnenden Nitrokörper und Amine häufig Ausgangspunkte für die Darstellung der übrigen Derivate sind; es finden sich jedoch auch hier analoge Fälle, z. B. die Auffindung des Anthramins nach und aus dem Anthrol. Betrachten wir weiter die höher oxydirten Kohlenwasserstoffe, die Säuren, so finden wir die Essigsäure schon bei Moses erwähnt und begegnen ihr

in der ganzen Weltgeschichte; die Ameisensäure wurde zuerst von Way 1670 dargestellt und 1749 von Marggraf näher untersucht; die Oxalsäure wurde 1773 zuerst von Savary erwähnt und 2 Jahre später bestimmte Lavoisier die Zusammensetzung der Kohlenensäure, welche schon im 17. Jahrhundert von van Helmont als eigenthümliches Gas erkannt war. Das derselben entsprechende Monamid ist im freien Zustande noch nicht bekannt; das Diamid, der Harnstoff oder Carbamid, wurde allerdings schon 1773 aufgefunden, aber erst 1799 rein und 1828 synthetisch dargestellt. Die Gewinnung eines Tri- oder Tetramides der vierbasischen Kohlenensäure ist ebenso wenig möglich gewesen, wie die dieser Verbindung in freiem Zustande selbst. Das Oxamid wurde fast ein halbes Jahrhundert später entdeckt (1817 von Bauhof), als die entsprechende Säure. Das Acetamid stellten Dumas, Malagutti und Leblanc zuerst 1847¹⁾ dar und das Formamid fand A. W. Hofmann sogar erst 1863 auf.²⁾

Außer diesen Amiden ist noch eine große Zahl anderer stickstoffhaltiger und theilweise stickstoffreicherer Derivate der Säuren möglich. Die jüngste Zeit hat unsere Kenntnise einer Klasse derselben sehr vermehrt. Wird das Sauerstoffatom der Amide durch die Imidgruppe NH ersetzt, so resultiren neue Körper, die Amidine. Diese Gruppe von Derivaten ist in den letzten Jahren von Wallach und seinen Schülern³⁾ genauer studirt und hat eigentlich erst durch ihn eine wichtigere Stellung in der Chemie erhalten. Er hat sich fast ausschliesslich mit den Amidinen beschäftigt, die von den Säuren der Formel $C_n H_{2n} O_2$ und $C_n H_{2n-2} O_4$ abstammen und sich begnügt, darauf hinzuweisen, daß das schon länger und gründlich ge-

¹⁾ Dumas, Malagutti, Leblanc, Compt. rend. XXV, 657.

²⁾ A. W. Hofmann, Jahresberichte etc. 1863, 319.

³⁾ O. Wallach etc. Berichte deutsch. chem. Ges. VIII, 299 u. folg. sowie Liebigs Ann. 184, 1 u. folg.

kannte Guanidin das Amidin der Kohlenfäure ist. Es sei mir deshalb gestattet, von diesem Gesichtspunkte aus das Guanidin zu betrachten. Daran soll sich eine Besprechung einiger anderer Amidine, entstanden durch Addition von Cyan an substituirte Guanidine, schliessen, die man, wie Bernthsen¹⁾ zuerst bemerkt hat, auch als Amidine zweibasischer Säuren betrachten kann. Der experimentelle Theil dieser Abhandlung verknüpft die 2 Gegenstände.

A. Die Amidine im Allgemeinen.

In seiner ersten grössern Abhandlung über diesen Gegenstand²⁾ gibt Wallach die Definition: »Die Amidine sind Säureamide, in welchen der Sauerstoff des Amids durch die zweiwerthige Gruppe (NR)^{II} vertreten wird.« Will man diese selbstständige Körperklasse unabhängig von andern definiren, so kann man sagen: »Die Amidine sind Basen, characterisirt durch die zweiwerthige Imidgruppe (NH)^{II} und die einwerthige Amidgruppe (NH₂)^I, welche mit ihren 3 ungesättigten Affinitäten an ein gemeinsames Kohlenstoffatom gebunden sind, dessen letzte Valenz ein einwerthiges Radical hält. Sie haben

daher die gemeinsame Formel
$$\begin{array}{c} \diagup R_I \\ C=NR^{II} \\ \diagdown NR^{III} R^{IV} \end{array}$$
 wo R_I, R_{II}, R_{III} und

R_{IV} das gleiche oder verschiedene einfache oder zusammengesetzte Radicale bedeuten.«

Diese Erklärung ist inhaltlich mit der von Wallach identisch und lässt Raum für alle verschiedenen Arten von Amidinen. Sind z. B. R_I, R_{II}, R_{III} und R_{IV} = H, so stellen sie den einfachsten Repräsentanten dieser Klasse das Methenyl- oder Formamidin HC(NH)(NH₂) dar.³⁾ Ist c. p. R_I = CH₃, so haben wir eines der zuerst aufgefundenen Glieder dieser

¹⁾ Bernthsen, Liebigs Ann. 184, 337.


²⁾ O. Wallach, Liebigs Ann. 184, 121.

³⁾ Gautier, Zeitschr. für Chemie 1867, 659.


Verbindungsarten vor uns, das 1857 von Strecker entdeckte und auch bezüglich seiner Constitution annähernd erkannte Acediamin (resp. Aethenyl- oder Acetamidin) $\text{CH}_3 \text{C}(\text{NH})(\text{NH}_2)$.¹⁾ Denken wir uns aber c. p. R₁ gleich dem Amidinrest $\text{C}(\text{NH})(\text{NH}_2)$, so haben wir das zur Zeit noch nicht dargestellte Oxamidin

$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \diagup \\ \text{C} \\ \diagdown \\ \text{NH} \\ \diagup \\ \text{C} \\ \diagdown \\ \text{NH}_2 \end{array}$ den einfachsten Vertreter der Amidine der Oxalsäure-reihe. Es ist durchaus nicht unmöglich, daß dieser

Körper — analog dem später zu erwähnenden Cyananilin — bei der Behandlung von Ammoniak mit Cyangas entsteht und bisher in Folge leichter Veränderlichkeit noch nicht isolirt ist. Jedenfalls zeigt die mutmaßliche Structur des von Wöhler entdeckten Hydrazulmoxins und besonders des Hydrazulmins unverkennbare Beziehungen zum hypothetischen Oxamidin:



Hydrazulmoxin;



Hydrazulmin.²⁾

In den allerjüngsten Tagen hat A. Pinner³⁾ die Gewinnung des Oxamidins aus dem Oximidoäther und Ammoniak in Aussicht gestellt, nachdem er das höhere Homologe desselben, das Succinamidin $\{\text{CH}_2 \text{C}(\text{NH})(\text{NH}_2)\}_2$ auf diesem Wege gewonnen. Dieser Gruppe gehören, wie schon angedeutet, das 1848 von A. W. Hofmann aufgefundene Cyananilin oder Diphenyloxamidin⁴⁾ $\{\text{C}(\text{NH})(\text{NHC}_6\text{H}_5)\}_2$ und die analogen Derivate des Tolidin und Cumidin, auch das Cyanbenzylamin von Strakosch⁵⁾ u. A. m. (s. u.) an.

¹⁾ Strecker, Liebigs Ann. 103, 328.

²⁾ Jacobsen und Emmerling, Berichte deutsch. chem. Gef. IV. 949.


³⁾ A. Pinner ib. XVI. 359.

⁴⁾ A. W. Hofmann, Liebigs Ann. 66, 129.


⁵⁾ Strakosch, Berichte deutsch. chem. Gef. V. 693.

Ist aber in jener oben gegebenen allgemeinen Amidinformel $R_I = NH_2$ und die übrigen Radicale $= H$, so haben wir das einfache Guanidin $C(NH_2)_2(NH)$ (s. u.) Alle Wasserstoffatome in dieser Formel können (wie auch in den oben besprochenen Amidinen) durch einwerthige Radicale sämmtlich oder zum Theil ersetzt sein, und so resultirt eine große Zahl von Derivaten, von denen eine nicht unbeträchtliche bekannt ist. Besonders sind fast für jede einzelne Klasse von Abkömmlingen des Guanidins Vertreter dargestellt.


Die allgemeine Amidinformel läßt noch eine Reihe von Körpern voraussehen, auf die auch andere Erwägungen führen. Wie man die Kohlenfäure als Oxyameisensäure auffassen kann, darf man die (hypothetische) Carbaminsäure auch als Amidoameisensäure¹⁾ und das Guanidin als deren Amidin betrachten. Ebenso wie man sich nun Homologe der Ameisensäure, der Oxy- und Amidoameisensäure denken oder darstellen kann, darf man auch Homologe dieses Amidins erwarten; es wären dies die Amidine der Amidosäuren oder Alanine. Bei der Bedeutung, die einerseits das Guanidin, andererseits die Alanine für die physiologische Chemie besitzen, ist diesen Körpern eine interessante Seite von vornherein gewiß nicht abzusprechen, wenngleich sie sich schon dadurch vom Guanidin unterscheiden würden, daß die beiden Amidogruppen nicht wie in diesem an dasselbe Kohlenstoffatom gebunden sind. Bekannt sind zur Zeit noch keine Repräsentanten derselben. Ihr Zusammenhang mit den Amidinen im Allgemeinen und den Guanidinen im Besondern ergibt sich aus folgenden Formeln:



Amidine;



Guanidine;



Amidine der Alanine.

Es bedarf wohl keiner Erwähnung, daß an die Stelle der Gruppe $(CH_2)_n$ auch ein zweiwerthiger aromatischer Rest treten

¹⁾ cf. Erlenmeyer, Lehrbuch p. 188.

kann, so dafs z. B. das Amidin der Anthranilsäure: $C(C_6H_4NH_2)(NH)(NH_2)$ Anthranilamidin entstände.

Nach dem allgemeinen Amidinschema ist noch eine eigenthümliche Klasse von Verbindungen zusammengesetzt; die Anhydrobasen von Hobrecker und Hübner. Ersterer fand sie auf¹⁾ durch Reduction der Nitracetamidverbindungen in der Absicht, Analoga der von A. W. Hofmann einige Jahre früher aus Säuren und Aminen vermittelt Phosphorchlorür erhaltenen Amidine — der fog. Aethenylbasen — zu gewinnen. Die entstehenden Diamidoverbindungen, deren eine Amidgruppe einen Säurerest enthält, gehen durch Wasseraustritt in Amidine über; $C_6H_4 \begin{matrix} \diagup NH_2 \\ \diagdown NH \end{matrix} CO CH_3 - H_2O = C_6H_4 \begin{matrix} \diagup NH \\ \diagdown N \end{matrix} \equiv C CH_3$, (wobei unentschieden bleibt, ob die Wasserstoffatome vom selben Stickstoffatome oder von verschiedenen genommen werden.) Diese Verbindungen sind besonders von Hübner und seinen Schülern²⁾ näher untersucht. Dieser hat vor Allem die wichtige Thatsache festgestellt, dafs nur Ortho-, nicht Meta- oder Paradiamidokörper dieser Condensation fähig sind. Auch Ladenburg³⁾ hat sich mit ihnen beschäftigt. Sie unterscheiden sich von den gewöhnlichen Amidinen dadurch, dafs die beiden Stickstoffatome an das gleiche Radical gebunden sind. In Folge dessen ist auch ihr chemisches Verhalten wesentlich anders, als das der gewöhnlichen Amidine.

Ich will jedoch diese Gedanken nicht weiter ausspinnen und von der Constitution der Amidine zu deren Eigenschaften übergehen. Die Amidine zeichnen sich gerade nicht durch eine besondere Fähigkeit aus, durch Umsetzungen in andere Körperklassen überzugehen. Ihre tiefgreifenden Veränderungen sind fast nur Rückbildungen der Körper, aus denen sie entstanden sind; ich möchte fast sagen, sie bilden den Schlussstein einer Reihe von Reactionen.

¹⁾ Hobrecker, Berichte deutsch. chem. Gef. V. 920.

²⁾ Hübner, ib. VI u. folg. und Liebigs Ann. 208 u. folg.

³⁾ Ladenburg, Berichte deutsch. chem. Gef. VIII u. folg.

RCN (Nitril)


RCONH₂ (Amid)

RCSNH₂ (Thiamid)


RC(NH)NH₂ (Amidin).

Diese beiden hier angedeuteten Wege vom Nitril über die beiden verschiedenen Amide zum Amidin kann man vorwärts und rückwärts experimentell durchlaufen. Damit ist aber die Reactionsfähigkeit der Letzteren im Wesentlichen erschöpft. Im Uebrigen kann fast nur noch ihr Wasserstoff substituirt werden durch einfache oder zusammengesetzte Radicale.

Schon direct aus dem Nitril und Ammoniak kann der Theorie nach ein Amidin entstehen, und in einzelnen Fällen ist eine solche Darstellung durchgeführt. Vielleicht kann man die Entstehung des einfachsten Amidins, des Formamidins (l. c.) aus Blausäurehydrochlorat und Alkohol dem entsprechend auffassen.



Auch die Darstellung des Propionamidin von Pinner und Klein¹⁾ scheint so ihre Erklärung zu finden:



Interessant ist ferner die ganz analoge Bildung des Isuret, welches ein hydroxylirtes Amidin ist. Es entsteht durch Vereinigung von Blausäure und Hydroxylamin²⁾:



Jedoch ist dieser Weg für die Darstellung von Amidinen der Formel RCN₂H₃ (wo R ein organisches Radical bedeutet) nur mit geringem Erfolge beschritten, weil die gesuchten Körper bei der Isolirung leicht zerfallen. Wir haben aber so verschiedene substituirte Amidine erhalten. Nach Bernthsen³⁾ entstehen beim Erhitzen von Acetonitril mit salzsaurem Anilin die Chlorhydrate des Aethenylphenyl- und des Aethenyldiphenyl-



¹⁾ Pinner und Klein, Berichte deutsch. chem. Ges. XI, 1484.

²⁾ Löffen und Schieferdecker, Liebigs Ann. 166, 295.

³⁾ Bernthsen ib. 184, 338—365.

amidin und analog vermittelt Toluidin das Aethenylditolylamidin. Benzonitril liefert entsprechend behandelt Mono- und Diphenylbenzenylamidin, so wie die homologen Tolyverbindungen, während Benzylcyanid mit salzsaurem Anilin, resp. Toluidin salzsaures Phenyl-, resp. Tolyacetmonotolylamidin giebt. Derselbe Forscher hat gezeigt,¹⁾ daß sich Acetonitril und Benzonitril mit Diphenylamin zu Aethenyl- bez. Benzenylfodiphenylamidin vereinigen, welche unter den oben angeführten Körpern Isomere finden. Diese Reaction, welche erst in den letzten Jahren für die Darstellung der Amidine einbasischer Säuren angewandt ist, hat schon seit 15 Jahren zur Synthese des einfachen Guanidins und seiner Substitutionsderivate gedient und die Brauchbarkeit für diese hat dazu geführt, ihre Verwendbarkeit für jene zu prüfen,²⁾ nachdem schon früher H. Wichelhaus³⁾ diesen Gedanken ausgesprochen hatte.

Schon 1868 zeigte E. Erlenmeyer,⁴⁾ nachdem unter Anderen 7 Jahre vorher Strecker aus Cyanamid und Glycocoll Glycocycin gewonnen hatte,⁵⁾ daß beim Erhitzen von Cyanamid mit Salmiak Guanidinchlorhydrat entstände. Die Analogie der Reaction springt in die Augen:



Durch Anwendung organischer Basen statt des Ammoniaks einerseits und substituierter Cyanamide [der Formel $\text{C} \equiv \text{N} (\text{NRH})$]

¹⁾ Bernthsen, Liebigs Ann. 192, 1—29.

²⁾ Bernthsen ib. 184, 338.

³⁾ Wichelhaus, Berichte deutsch. chem. Ges. III, 4.

⁴⁾ Erlenmeyer, Liebigs Ann. 146, 258.

⁵⁾ Strecker, Compt. rend. 52, 1210.

andererseits sind nach dieser Methode manche Guanidine dargestellt, von denen einige für die physiologische Chemie von hervorragendem Interesse sind. (Die Neigung der substituirten Cyanamide, sich — unter Verlust ihrer Reactionsfähigkeit — zu polymerisiren, hindert allerdings vielfach die Ausführung dieser Reaction). Dieser Gegenstand wird unten ausführlicher behandelt.

Die Darstellung der Oxamidine (pag. 33) ist ebenfalls eine einfache Anwendung dieser Methode. Das Nitril der Oxalsäure geht die ganz analoge Umfetzung mit dem Ammoniak, resp. Aminen ein.

Wie schon gesagt, können die Amidine auch indirect aus den Nitrilen dargestellt werden auf dem Umwege über die Amide sowohl, wie über die Thiamide.

Schon vor 18 Jahren hat A. W. Hofmann¹⁾ durch Einwirkung von Phosphorchlorür auf substituirte Amide (bes. Acetanilid) in Gegenwart von Anilin, Toluidin, Naphtylamin oder Diphenylamin eine Anzahl von Amidinen erhalten, die unter dem Namen der Hofmann'schen Aethenylbasen beschrieben werden. Der Entdecker erkannte sofort, daß sie in dieselbe Klasse, wie Streckers Acediamin gehörten.

Schon früher hat Gerhardt,²⁾ der so manches Gebiet flüchtig berührt und darauf fruchtbringende Saat gepflanzt hat, aus den Amidin Amidine dargestellt und dadurch die Amidine einbasischer Säuren überhaupt entdeckt. Diese Untersuchung hat neuerdings O. Wallach³⁾ mit großem Erfolge aufgenommen. Die betr. Arbeiten sind sehr umfangreich und scheinen noch nicht zur Hälfte beendet zu sein.


Werden nämlich Säureamide mit Phosphorpentachlorid behandelt, so wird, wie Gerhardt zuerst behauptete und Wallach

¹⁾ A. W. Hofmann, Berl. acad. Berichte 1865, 649; und Zeitschr. für Chemie 1866, 161.

²⁾ Gerhardt, Liebigs Ann. 108, 214.

³⁾ Wallach, ib. 184, 83.

(l. c.) bewies, deren Sauerstoff (Ketonfauerstoff) durch 2 Atome Chlor ersetzt. Es entstehen so Amidchloride, welche leicht durch Verlust von 1 Mol. HCl in Imidchloride übergehen. Durch weitere Abspaltung eines Molecül Salzfäure entstehen daraus die entsprechenden Nitrile:




Für uns kommen die Modificationen nicht in Betracht, die bei substituirtten Amiden stattfinden. Wirken auf die Imidchloride Ammoniak oder Aminbasen ein, so spalten sich das Chloratom und ein Amidwasserstoffatom der zweiten Base zusammen ab, und der Rest vereinigt sich:



Die Amidchloride spalten bei gleicher Behandlung vorher 1 Mol. HCl ab und verhalten sich dann ebenso:



Auf diesem Wege sind bis jetzt noch keine Guanidine dargestellt. Die Reaction kann analog, kann jedoch auch ganz anders verlaufen. Es können nemlich erstens Imidchloride entstehen, die sich ganz wie eben beschrieben verhalten:



Es können aber in zweierlei Art aus dem Amidchlorid 2 Molecüle Salzfäure austreten und dadurch entweder Cyanamide¹⁾ oder Carbimide entstehen:




Jedoch ist leicht zu erkennen, dafs die symmetrischen di-

¹⁾ Vergl. Wallach Berichte deutsch. chem. Gef. XIV, 736. Einwirkung von PCl₅ auf Iodiäthyloxamid, Bildung des Diäthylcarbaminocyanid.

substituirten Harnstoffe keine Cyanamide und die trifubstituirten weder diese noch Carbinide bilden können, da ihnen die nöthigen typischen Wasserstoffatome fehlen.


Das Verhalten der Cyanamide ist bereits erwähnt. Wir kennen auch Carbinide. Sie können noch 1 Mol. Ammoniak oder Amin (u. A. m.) aufnehmen und dadurch in Guanidine übergehen:



In neuester Zeit hat Wallach den Umweg über die Amide wesentlich verkürzt. Er zeigte¹⁾ erstens, daß die Reaction, durch welche Strecker (l. c.) feinerzeit das Acetamidin gefunden, allgemeinerer Anwendung fähig sei. Wirkt Salzsäure in der Hitze auf einfache oder substituirt Säureamide, so entstehen folgendermassen Amidine:



An derselben Stelle zeigt er weiter, dass die Salzsäure überflüssig ist. Beim Erhitzen von Acetanilid mit Anilinchlorhydrat entsteht eine sehr reichliche Menge Diphenylacetamidin.



Bei meinen Bemühungen, monosubstituirt Guanidine zu gewinnen, hätte ich gern versucht, solche aus dem Caramid und Aminen auf einem der angedeuteten Wege darzustellen. Ich habe aber nicht gewagt, die wohlgegründeten und gewahrten Rechte des Herrn Wallach zu verletzen.

Während die Beziehungen der einbasischen Säureamide zu ihren Amidinen weit genauer studirt sind, als bei den betr. Derivaten der Kohlen Säure, so ist für die Thiamide das Ge-



¹⁾ Wallach, Berichte deutsch. chem. Ges. XV, 208.

gentheil der Fall. Die Kenntnisse, welche wir über die Thiamide der Fettsäurereihe besitzen, sind aus Analogien mit denen der Kohlensäure, den Thioharnstoffen, abgeleitet. Gleichzeitig und in demselben Laboratorium ist die Darstellung von Amidinen einbasischer Säuren aus ihren Amiden und ihren Thiamiden aufgefunden. Das Verdienst der letztern Entdeckung gebührt Bernthsen.¹⁾

Wie eben angedeutet, kennen wir schon seit längerer Zeit die Umwandlungen der Thioharnstoffe, als die der Thiamide einbasischer Säuren, und durch jene ist auch der Mechanismus der Reaction aufgeklärt. Entschwefelt man Thioharnstoffe (resp. Thiamide überhaupt) unter den geeigneten Bedingungen, so entstehen gewöhnliche Harnstoffe oder Guanidine (resp. Amide oder Amidine). Der Schwefel wird hier nicht einfach gegen Sauerstoff oder den Imidrest (NH)'' ausgetauscht, wie man zuerst annahm. W. Weith²⁾ wies nach, daß der Proceß in mehreren Phasen verlief. Durch Entschwefelung des Sulfo-carbanilid in einem wasserfreien Lösungsmittel, dem Benzol, erhielt er den nach seiner Structur von ihm Carbodiphenylimid



benannten Körper, der leicht Wasser, Schwefelwasserstoff, Ammoniak und Amine aufnahm, so daß Diphenylharnstoff, bezw. -Sulfoharnstoff, -Guanidin u. f. w. entstanden. Dadurch war erwiesen, daß die Entschwefelung in folgender Weise vor sich ging:




Daher erklärt sich auch, weshalb die monosubstituirten Thioharnstoffe so viel schwieriger in Guanidine übergeführt werden


¹⁾ Bernthsen, Liebigs Ann. 184, 290 u. 321.

²⁾ Weith, Berichte deutsch. chem. Ges. VII, 10.


können, als die disubstituirten. Erstere verlieren bei der Entschwefelung die Wasserstoffatome aus derselben Amidgruppe¹⁾ und gehen dadurch in die wenig reactionsfähigen Cyanamide über:



während die Letzteren die zu Umsetzungen äusserst geeigneten Carbimide bilden.²⁾ Dafs die Thiamide einbasischer Säuren sich hier ganz analog verhalten, geht aus der citirten Arbeit von Bernthsen mit Sicherheit hervor, wenngleich er es nicht ausgesprochen hat. Bei der Entschwefelung von Phenylaceto-thiamid mit Queckfilberoxyd in Gegenwart von Ammoniak, entstand nicht Phenylacetamidin, sondern Phenylacetonitril (Benzylcyanid). Dieses reagirt nicht mehr mit Ammoniak (cf. die substituirtten Cyanamide). Der Prozeß war also nach folgender Gleichung verlaufen:



Wurde statt des Queckfilberoxyd das Chlorid angewandt, so entstand das Amidin; aber Bernthsen giebt selbst zu, dafs eine intermediäre Bildung von NHgCl_2 die Ursache sein könnte:



Uebrigens entstehen substituirtte Amidine einbasischer Säuren der Formel $\text{RC}(\text{N}_2\text{RH}_2)$ und $\text{RC}(\text{N}_2\text{R}_2\text{H})$ auch durch directe Einwirkung von Aminen auf Thiamide,³⁾


Wie schon auf Seite 9 angedeutet wurde, vollzieht sich, noch leichter als ihre Entstehung aus Amidin und Thiamiden, die Rückbildung der Amidine in diese.

¹⁾ A. W. Hofmann, Berichte deutsch. chem. Ges. II, 600.

²⁾ Auch der einfache Sulfoharnstoff CSN_2H_4 verliert bei der Entschwefelung die Wasserstoffatome aus demselben Amidflügel (vorausgesetzt, dafs Cyanamid $\text{CN}(\text{NH}_2)$ und nicht Carbodiimid $\text{C}(\text{NH})_2$ sei).


³⁾ Bernthsen, Liebigs Ann. 184, 342.

Es ist bekannt, daß Strecker das Acediamin nicht aus feinen Salzen isoliren konnte, weil es sich sofort in Essigsäure und Ammoniak zersetzte. Die Imidgruppe wurde durch Sauerstoff substituirt (und das Amid weiter verseift):



Auch Gautier berichtet (l. c.), daß Formamidin mit Kali sich in Ameisensäure und Ammoniak spalte.

Diese Umsetzung ist mehr oder minder leicht ganz allgemein durchführbar. Phenylacetamidin wird zum Beispiel schon durch Wasser in der Kälte in Phenylacetamid und Ammoniak zersetzt. Ohne noch andere Belege anzuführen, will ich nur bemerken, daß Wallach diesen Vorgang nicht als einfache Substitution auffaßt. Nach ihm nimmt das Amidin erst 1 Mol. H_2O auf und spaltet darauf 1 Mol. NH_3 ab:




Wie ich an anderer Stelle auszuführen habe, verhält sich das Guanidin ganz analog, indem es bei geeigneter Behandlung in sein Amidin, den Harnstoff, übergeht.

Die Rückbildung der Thiamide einbasischer Säuren aus ihren Amidinen — in der Guanidinreihe schon länger bekannt, hat A. Bernthsen¹⁾ vor kurzem auch zum Gegenstand einer erfolgreichen Untersuchung gemacht. Zunächst weist er nach, daß das geschwefelte Wasser, dem wirklichen Wasser analog, die Amidine in die Thiamide überführt:



Durch die Einwirkung von Schwefelkohlenstoff beweist er außer der Constitution der in Angriff genommenen Amidine — daß diese Reaction am besten durch intermediäre Entstehung von additionellen Producten zu erklären ist. Die Umsetzung liefert neben dem Thiamid noch Rhodanwasserstoff. Folgendes Schema erklärt dies:

¹⁾ Bernthsen, Liebigs Ann. 192, p. 1 u. 29 u. folg.



Das Isomere der Rhodanwasserstoffsäure ist im freien Zustande nicht bekannt. Statt dessen entsteht diese selbst durch Umlagerung $CS(NH) = CN(SH)$.

Es bleibt mir noch übrig, die bisher nicht erwähnten, wichtigsten Bildungsmethoden der Amidine kurz anzuführen (einige derselben nennt auch Wallach l. c.). Man kann dieselben aus einem gemeinsamen Gesichtspunkte auffassen: Die Reaction besteht darin, daß der sämmtliche Stickstoff der Ammoniakreste auf dem Wege der Substitution von Atomen oder Atomgruppen an Kohlenstoff gekettet wird.

Schon Limpricht berichtet gelegentlich seiner Untersuchung von Chlorsubstitutionsderivaten des Toluol,¹⁾ daß er durch Einwirkung von Aminbasen auf Benzotrichlorid Körper erhalten habe, die wir heute als Amidine betrachten. Gleichzeitig, aber unabhängig von ihm und speciell bei der Darstellung von Amidinen ist A. W. Hofmann²⁾ der Reaction auf den Grund gegangen. Er wandte möglichst einfache Materialien an und gelangte dadurch auch zu einfachen Produkten und erreichte die beabsichtigte Darstellung des Guanidins. Die Einwirkung von Ammoniak auf Tetrachlorkohlenstoff lieferte vermuthlich Guanidin, wenngleich sich daselbe nicht nachweisen liefs. Jedoch konnten Bolas und Groves³⁾ daselbe in Substanz, wenn auch in geringer Menge gewinnen, als sie statt des chlorirten den bromirten Kohlenstoff anwandten. Mit Leichtigkeit wurde daselbe durch Erhitzen von Chlorpikrin mit Ammoniak⁴⁾ erhalten:




¹⁾ Limpricht, Liebigs Ann. 133 u. 135 u. 139.

²⁾ A. W. Hofmann, Liebigs Ann. 139, 107.


³⁾ Bolas u. Groves, Liebigs Ann. 160, 174.

⁴⁾ A. W. Hofmann, Berichte deutsch. chem. Ges. I, 145.

Ganz analog wurde aus dem Orthokohlenensäureäther und Ammoniak (l. c.) Guanidin gewonnen:




Auch die von Steiner gelehrte Darstellung aus Knallquecksilber und Ammoniak¹⁾ dürfte hierher gehören:



ebenso Bouchardats Reaction von Phosgen und Ammoniak²⁾



Außer der oben erwähnten Arbeit von Limpricht haben uns aber auch noch andere die analoge Darstellung der Amidine einbasischer Säuren gelehrt. Wie die Guanidine ein Kohlenstoffatom enthalten, dessen vier Valenzen durch Stickstoff gefättigt, während das entsprechende Kohlenstoffatom dieser Amidine nur mittelst dreier Werthigkeiten mit Stickstoff verbunden ist, so werden jene aus vierfach, diese aus dreifach substituirtten Methanen gewonnen. Während Guanidin aus Tetrachlorkohlenstoff, Nitroform und Orthokohlenensäureäther erhalten wurde, lieferten Chloroform und Orthoameisenensäureäther Amidine einbasischer Säuren. A. W. Hofmann³⁾ erreichte die Bildung des Formyldiphenyldiamin (Diphenylmethenylamidin) aus Chloroform und Anilin und H. Wichelhaus die des Methenyldiacetylaminidin aus Orthoameisenensäureäther und Acetamid⁴⁾:



Hierher gehören auch noch die Bildung von Methenyldiphenylamidin von Weith⁵⁾ durch Destillation von Ameisenensäure

¹⁾ Steiner, Berichte deutsch. chem. Gef. VIII. 518.

²⁾ Bouchardat, Liebigs Ann. 154, 354.


³⁾ A. W. Hofmann, Jahresberichte etc. 1858, 354.

⁴⁾ Wichelhaus, Berichte deutsch. chem. Gef. III, 2.

⁵⁾ Weith, ib. IX, 458.


und Anilin: $\text{HC} \begin{smallmatrix} \diagup \text{O} \\ \diagdown (\text{OH}) \end{smallmatrix} + \frac{\text{H}_2\text{NC}_6\text{H}_5}{\text{HNHC}_6\text{H}_5} = \text{HC} \begin{smallmatrix} \diagup \text{NC}_6\text{H}_5 \\ \diagdown \text{NC}_6\text{H}_5\text{H} \end{smallmatrix} + 2\text{H}_2\text{O}$

und die von Ladenburg¹⁾ bewerkstelligte einer Anhydrobase (s. o.). Erhitzen des Phenylen- (resp. Toluylen-)diamin mit Essigsäure gab ihm Aethenylphenylen- (resp. Toluylen-)amidin:




Eine allgemeine Methode zur Darstellung der Anhydrobasen ist Seite 8 angegeben.

Es ist bisher in den Gleichungen immer nur der Anfang und das Ende der Reaction geschildert worden. Wallach (und auch Bernthsen) nehmen noch eine dazwischen liegende Phase an, in welcher die sämmtlichen, nicht durch andere als Stickstoffatome besetzten Valenzen des Kohlenstoffs durch Amidgruppen gesättigt sind, wonach sich dann 1 Mol. Ammoniak oder Amin abspaltet:



Wallach meint, ganz ähnlich verlaufe der Austausch der Imidgruppe gegen Sauerstoff unter intermediärer Anlagerung von Wasser ($\text{H} + \text{OH}$):




Er wird zu dieser Annahme durch die Erscheinung veranlaßt, daß die Anhydrobasen, welche eine eigenthümliche Form der Atomgruppierung $\text{RC} \begin{smallmatrix} \diagup \text{N} \\ \diagdown \text{NH} \end{smallmatrix} \text{R}''$ haben, so daß bei ihnen die Abspaltung wesentlich erschwert ist, solche Additionsprodukte wirklich geben.²⁾ Uebrigens spricht schon Erlen-

¹⁾ Ladenburg, Berichte deutsch. chem. Ges., VIII, 677.

²⁾ Kelbe, ib. VIII, 875.

meyer in seinem Lehrbuch p. 206 bez. des Guanidins dieselbe Ansicht aus.


Zum Schluss sei noch eine eigenthümliche Bildungsweise des Methenyldiphenylamidin erwähnt. W. Weith¹⁾ erhielt dasselbe aus Cyanphenyl (Carbylamin) und Anilin. Die Reaction ist leicht verständlich nach dem Schema:



B. Das Guanidin und seine anorganische Substituenten enthaltenden Derivate.

Die Körperklasse der Guanidine wurde von A. W. Hofmann²⁾ im Jahre 1848 gelegentlich seiner Arbeiten über die flüchtigen organischen Basen entdeckt. Er erhielt durch Einwirkung von Chlorcyan auf Anilin das «Melanilin», welches er 20 Jahre später,³⁾ da der Prototyp bekannt geworden war, als Diphenylguanidin auffassen lehrte: $\text{C}_{13}\text{H}_{15}\text{N}_3 = \text{CNH}(\text{NHC}_6\text{H}_5)_2$.

Das einfache Guanidin hatte Strecker⁴⁾ im Jahre 1861 durch Oxydation des Guanins (einer der sog. Fleischbasen) erhalten (neben Paraban Säure):



Guanin

Guanidin

Paraban Säure.

Bald darauf gewann es auch Finckh⁵⁾ durch Behandlung von Biuret mit Salzsäure in der Hitze. Man stellt es am Besten dar nach Delitsch⁶⁾ und Volhard,⁷⁾ indem man Rhodan ammonium auf 180° — 190° erhitzt. Es entsteht das Rhodanat nach der Gleichung:



¹⁾ Weith, Berichte deutsch. chem. Gef. IX, 454.

²⁾ A. W. Hofmann, Liebigs Ann. 67, 129.

³⁾ Derf. Berichte deutsch. chem. Gef. I, 146 u. VII, 947.

⁴⁾ Strecker, Liebigs Ann. 118, 159.

⁵⁾ Finckh, ib. 124, 332.

⁶⁾ Delitsch, Journ. f. pract. Chemie (2) 8, 240 u. 9, 2.

⁷⁾ Volhard, ib. 9, 15 u. Berichte deutsch. chem. Gef. VII. 92.

Ein daneben verlaufender Proceß kommt hier nicht in Betracht. Volhard gewann übrigens auch das Guanidin nach dieser Methode, als er direct Cyanamid mit Rhodanammonium erhitzte (l. c.). Andere Darstellungen siehe Seite 17 u. 18.

Wir sind bisher immer von der Ansicht ausgegangen, das

Guanidin sei $\begin{array}{c} \diagup \text{NH}_2 \\ \text{C}=\text{NH} \\ \diagdown \text{NH}_2 \end{array}$ constituirt. In der That läßt die Valenz-


theorie in der allgemeinsten Interpretation der Fähigkeit der Atome, sich mit einander zu verketten, für dasselbe relativ nur wenig Combinationen zu, und von diesen ist wieder die bisher benutzte die einzige, welche dem chemischen Verhalten des Guanidins entspricht und wahrscheinlich auch die einzige, welche realisirbar ist. Bei allen andern kann man die Gruppierung (N_2) nicht umgehen wie in



(um von zweiwerthigem Kohlenstoff oder fünfwerthigem Stickstoff ganz abzusehen).

Für die Existenzfähigkeit dieser Körper spricht keine Thatsache; ein Vergleich mit den Azoverbindungen scheint unmöglich.

Aber die Constitution $\text{C}(\text{NH})(\text{NH}_2)_2$ ist durch Aufbau und Abbau unzweifelhaft bewiesen. Dafür sprechen in erster Linie die schon Seite 17 angeführten Synthesen von Hofmann, Bolas und Groves, Steiner und von Bouchardat aus Methanderivaten und Ammoniak durch Substitution, in zweiter Linie der Austausch der Imidgruppe gegen Sauerstoff und Schwefel. Die erstere Reaction ist zuerst von A. W. Hofmann durchgeführt.¹⁾ Er erhielt beim Erhitzen von Guanidin mit Anilin Diphenylharnstoff (Carbanilid):



¹⁾ A. W. Hofmann, Berichte deutsch. chem. Ges. I, 147, vergl. auch ib. VII. 949.

E. Baumann¹⁾ berichtet, daß Guanidin mit Barytwasser behandelt, leicht in Carbamid übergehe. Mc. Creath²⁾ erhielt durch Einwirkung von Benzoësäureanhydrid auf Guanidin Dibenzoylharnstoff. Auf gleiche Weise ist wohl J. Offikowskys³⁾ Beobachtung aufzufassen, daß Guanidin mit Schwefelsäure Kohlendioxyd, mit Bafen Ammoniak entwickle:



Als Beweis der Constitution des Guanidin möchte ich noch Jouffelin's Nitroguanidin⁴⁾ nennen. Durch dieses ist die Imidgruppe nachgewiesen.

Interessant ist noch Bannows⁵⁾ Darstellungsmethode des Guanidins. Jodcyan wirkt auf Ammoniak; intermediär entstehen Cyanamid und Ammoniumjodid, die sich sofort weiter in Guanidinjodhydrat umsetzen:



Bei Anwendung von Chlorcyan bleibt die Reaction in der Mitte stehen, vergl. jedoch die Entdeckung des Melanilins (Seite 20).

An die Besprechung des einfachen Guanidins schliesse ich die feiner Derivate mit anorganischen Substituenten. Solche sind nur in geringer Menge bekannt. J. Kamensky⁶⁾ stellte sehr unbeständige und nicht mit Sicherheit nachgewiesene Monobrom- und Monochlorguanidine $\text{CN}_3\text{H}_4\text{Br}$ und $\text{CN}_3\text{H}_4\text{Cl}$ dar. Rechenberg⁷⁾ liefs Jod auf Guanidincarbonat und Nitroguanidin einwirken und erhielt nicht näher bestimmte Producte.

Neuerdings hat (um dies bei den Halogensubstituten an-

¹⁾ Baumann, Berichte deutsch. chem. Gef. VI, 1376.

²⁾ Mc. Creath, ib. VI, 1739,

³⁾ Offikowsky, ib. V, 668.


⁴⁾ Jouffelin, Compt. rend. 85, 548.

⁵⁾ Bannow, Berichte deutsch. chem. Gef. IV, 161.


⁶⁾ Kamensky, ib. XI, 619 u. 1600.

⁷⁾ Rechenberg, ib. XI. 870.

zuführen) E. Bamberger¹⁾ die Vermuthung ausgesprochen, das Dicyandiamid sei Cyanguanidin; diese Auffassung steht mit feiner Entstehung in Einklang und erklärte, weshalb sich das Cyanamid in Dicyanamid und nicht gleich den substituirten Cyanamiden in Melamin umwandelt; auch zeigte sie eine Analogie in der Bildung mit der des sofort zu erwähnenden Oxyguanidin:




Das Oxyguanidin entsteht nach Prätorius²⁾ aus Cyanamid und Hydroxylamin:



Ein Nitrofoguanidin $\text{C}(\text{NH}_2)_2(\text{NNO})$ ist von Jouffelin gewonnen (f. o.).

C. Organische Radicale enthaltende Substitutionsderivate des Guanidins.

Wenn man von solchen substituirten Guanidinen spricht, so folgt man darin der typischen Anschauungsweise. Bis jetzt ist es nicht gelungen, dieselben aus dem Guanidin oder dieses aus ihnen darzustellen. Sie sind nur durch Synthesen (zuweilen auch durch Abbau) erhalten worden, die denen des einfachen Guanidins vielfach analog sind. Wenn wir demnach solche als Derivate ansprechen, so fassen wir das Guanidin als den Prototypen auf, auf welchen wir die andern Körper durch theoretische Ableitung beziehen, z. B.:




Guanidin; Methylguanidin; β Triphenylguanidin Tetraphenylguanidin.

Von den einfach substituirten Guanidinen der Formel

¹⁾ Bamberger, Inaug.-Diff. Berlin 1881, pag. 7.

²⁾ Prätorius, Journ. f. pract. Chemie (2) 21, 132.

$\text{CN}_3\text{H}_4\text{R}^1$ sind je 2 Isomere möglich, je nachdem das Radical in die Amid- oder in die Imidgruppe tritt:



unsymmetrische symmetrische Guanidine.

Diese beiden Klassen sind noch ziemlich wenig bekannt, weil es bis jetzt an einer einfachen, allgemeinen Darstellungsmethode derselben fehlt. Jedoch hat uns die physiologische Chemie eine Reihe von Körpern gelehrt, die alle als monosubstituirte Guanidine aufzufassen sind, vor Allem das Kreatin und vielleicht auch das Allantoin, und dieser Zweig unserer Wissenschaft hat uns auch die einzige Methode für die Synthese monosubstituierter Guanidine gebracht.

Schon 1861 versuchte Strecker¹⁾ — von der Ansicht ausgehend, das Kreatin sei eine Verbindung von Cyanamid und Methylglycocoll — ein Homologes desselben nach dieser Idee darzustellen. Die Einwirkung von Cyanamid auf Glycocoll lieferte ihm auch wirklich den gesuchten Körper, welchen er Glycocyamin nannte:



Diese Methode wurde später von Volhard,²⁾ sowie von Strecker und Rosengarten³⁾ für die Gewinnung des Kreatins aus Sarkosin und Cyanamid angewandt. Als allgemeinen Weg hat sie zuerst E. Erlenmeyer im Jahre 1868⁴⁾ und 1870⁵⁾ benutzt und Monomethyl-, Monophenyl- und Monoparatolylguanidin dargestellt. Doch sind dieselben noch nicht näher, ebenso wenig das vergeblich von Berger auf diesem Wege gesuchte,⁶⁾

¹⁾ Strecker, Compt. rend. 52, 1210.

²⁾ Volhard, Chem. Centr. 1869, 364.

³⁾ Strecker und Rosengarten, Liebigs Ann. 157, 4.

⁴⁾ Erlenmeyer, ib. 146, 258.

⁵⁾ Derf., Berichte deutsch. chem. Ges. III, 896.

⁶⁾ Berger, ib. XII, 1854.

aber von Jenem gefundene¹⁾ Monoorthotolylguanidin erklärt. Ausführlich ist nur das Monomethylguanidin beschrieben, das Tatarinoff²⁾ unter Erlenmeyers Leitung vor 4 Jahren zum Vergleich mit dem 1854 von Deffaignes³⁾ durch Oxydation des Kreatins erhaltenen Methyluramin untersuchte. Tatarinoff legt diesem Körper (er fand die beiden identisch) die unsymmetrische Structur bei. Tawildarow will durch Einwirkung von Methylcyanimid auf Ammoniak ein Monomethylguanidin erhalten haben, das mit diesem identisch sein sollte, nach seiner kurzen Beschreibung⁴⁾ aber verschieden zu sein scheint. Doch ist die Charakteristik nicht ausführlich und E. Baumann⁵⁾ gelang die Wiederholung des Versuches nicht.

Die Reaction ist vielfältig benutzt, um aus Cyanamid und Alaninen Monosubstitutionsderivate des Guanidins darzustellen; um nur einige zu erwähnen: mit Glycocoll Glycocyamin oder Guanidineffigsäure (f. o.), mit α Alanin Alakreatin,⁶⁾ mit β Alanin β Guanidopropionsäure,⁷⁾ mit α Amidobuttersäure α Oxybutyrocyamin.⁸⁾ P. Griess wies vermittelt dieser Reaction die Structur des auf anderem Wege gefundenen Benz kreatins nach, indem er es aus Cyanamid und Amidobenzoë Säure aufbaute.⁹⁾ Auch umgekehrt ist dieses Verfahren angewandt: statt einfachen Cyanamids nahm man ein substituirtes, statt substituirten Salmiaks den einfachen, vergl. oben Tawildarow. Meist wandte man jedoch auch substituirte Salmiake an und erhielt so mehrfach substituirte Guanidine, die erst weiter unten zu erwähnen sind.

¹⁾ Erlenmeyer, Berichte deutsch. chem. Gef. XIV, 1869.

²⁾ Tatarinoff, über Methylguanidine verschiedenen Ursprungs, München 1879 und Jahresber. für Chemie etc. 1879, 333.

³⁾ Deffaignes, Liebigs Ann. 92, 407 und 97, 340.

⁴⁾ Tawildarow, Berichte deutsch. chem. Gef. V, 477 (Referat).

⁵⁾ Baumann, ib. VI, 1372.

⁶⁾ Derf., Liebigs Ann. 167, 83.

⁷⁾ Mulder, Berichte deutsch. chem. Gef. VIII, 1266.


⁸⁾ Duvillier, ib. XIII, 1989.

⁹⁾ Griess, ib. VII, 574.

Neuerdings hat C. Feuerlein¹⁾ angegeben, daß Monophenylsulfoharnstoff durch Entschwefelung in Gegenwart von Ammoniak Monophenylguanidin geliefert habe, welches unter Ammoniakabspaltung leicht in Phenylcyanimid übergehe. Diese Beobachtung ist durch keine analytischen Resultate belegt, die der Silber- und Platinverbindungen weisen sogar angeblich auf ausschließlich entstandenes Phenylcyanimid. Ferner würde die Guanidinbildung allen sonstigen Erfahrungen (vergl. Seite 15) widersprechen und konnte auch von mir in der β Naphthylreihe (f. u.) nicht bestätigt werden. Der Versuch bedarf also wohl mindestens der Wiederholung.

Noch eine eigenthümliche Reihe von Körpern kann man als einfach substituirte Guanidine auffassen, welche E. Bamberger als guanylirte Harnstoffe, Schwefelharnstoffe und Guanidine bezeichnet. Zu nennen ist das Dicyandiamidin, das Haag durch Eindampfen von Dicyandiamid mit starken Säuren erhielt.²⁾

Ist letzteres wirklich Cyanguanidin (f. o.), so erklärt sich der Vorgang einfach:



und der Guanylharnstoff oder Dicyandiamidin wäre Formamidguanidin. Das von Rathke entdeckte Thiodicyandiamidin (Guanylthioharnstoff)³⁾ wäre Thioformamidguanidin $\text{CN}_3\text{H}_4(\text{CSNH}_2)$. Interessant für uns ist aber vor Allem das von Rathke entdeckte⁴⁾ Biguanid (Guanylguanidin), welches nach verschiedenen Methoden, unter anderen aus Rhodanguanidin und Cyanamid⁵⁾ dargestellt wird. Es ist zu betrachten als das unter Austritt von Ammoniak entstandene Condensationsproduct zweier Guanidinmoleküle, wobei man jede »Guanyl«-gruppe gleichsam

¹⁾ Feuerlein, Berichte deutsch. chem. Ges. XII, 1602.


²⁾ Haag, Liebigs Ann. 122, 25..

³⁾ Rathke, Berichte deutsch. chem. Ges. XII, 774.

⁴⁾ Derf., ib. XI, 967.

⁵⁾ Derf., ib. XII, 776.


als Grundlage der Verbindung, sowie als Substituens ansehen kann:



Bamberger hat noch verschiedene guanylierte Körper dargestellt,¹⁾ welche auch alle einfach-substituierte Guanidine sind.

Weit länger als die meisten bisher angeführten Verbindungen sind die zweifach substituierten Guanidine bekannt. Sie gehören überhaupt zu den ältesten Repräsentanten dieser ganzen Klasse. Schon vor 35 Jahren erhielt A. W. Hofmann gelegentlich seiner Arbeit: »Beiträge zur Kenntniss der flüchtigen organischen Basen«²⁾ einen Körper von der Zusammensetzung $\text{C}_{13}\text{H}_{13}\text{N}_3$, dem er zunächst den Namen Melanilin beilegte, und den er später als Diphenylguanidin erkannte.³⁾

Die Theorie läßt, wenn die beiden Substituenten identisch 3, wenn sie verschieden sind, sogar 4 isomere Bisubstitutions-derivate zu nach dem Schema:




wo II. und III. sich decken, wenn $\text{R}^I = \text{R}^{II}$.

Diese Form ist übrigens bis jetzt unbekannt. Wo man dieselbe erwartete, erhielt man immer die erste (symmetrische) welche die am besten studirte ist. Ihr gehört Hofmanns Melanilin an. Die Reaction, durch welche es aufgefunden wurde, erwies sich ihrem Entdecker als eine allgemeine: Leitet man Chlorcyan in eine organische Amid-Base, so entsteht das Chlorhydrat des entsprechenden zweifach-symmetrisch substituirten Guanidins:

¹⁾ Bamberger, Inaug.-Diff. Berlin 1881 und Berichte deutsch. chem. Gef. XIII.

²⁾ A. W. Hofmann, Liebigs Ann. 66, 129 und folg.

³⁾ Derf., ib. 67, 129 und Berichte deutsch. chem. Gef. I. 147; VII, 947.



Auf diese Weise erhielt W. Wilfon Ditytolylguanidin (Metoluidin), ¹⁾ W. H. Perkin Dizinaphthylguanidin (Menaphtalamin), ²⁾ B. Genz Dixylylguanidin (Mexylydin), ³⁾ und J. Strakofsch Dibenzylguanidin. ⁴⁾ In der Fettreihe ist dieser Versuch noch nicht gemacht, da die niedern aliphatischen Amine Gase oder leicht flüchtige Körper sind und sich deshalb schwer mit dem gasförmigen Chlorcyan behandeln lassen. Dieses Hinderniss scheint Erlenmeyer umgangen zu haben. Er theilt in einer kurzen Notiz mit, ⁵⁾ er habe aus Jodcyan (das bekanntlich starr ist) und Methylamin Dimethylguanidin erhalten.

Der Gang der Reaction ist von Cloëz und Cahours ⁶⁾ klargelegt. Es entsteht nemlich zuerst ein substituirtes Cynamid (Cyanimid), das mit noch unverbrauchtem Amin sich zum Guanidin umsetzt. Dieser zweite Theil des Processes, welcher der oben besprochenen Bildung des Guanidins und seiner Monosubstitutionsderivate ganz analog ist, wurde auch von ihnen für sich (l. c.), desgleichen von Weith und Schröder in der Phenylreihe, ⁷⁾ von Strakofsch in der Benzylreihe ⁴⁾ ausgeführt.



20 Jahre nach seiner Entdeckung der symmetrisch-zweifach substituirten Guanidine fand A. W. Hofmann einen viel bequemeren Weg zu ihrer Darstellung: die Entschwefelung der analogen Sulfoharnstoffe in Gegenwart von Ammoniak. ⁸⁾

¹⁾ Wilfon, Liebigs Ann. 77, 216.

²⁾ Perkin, ib. 98 236.

³⁾ Genz, Berichte deutsch. chem. Gef. II, 687.

⁴⁾ Strakofsch, ib. V, 695.


⁵⁾ Erlenmeyer, ib. XIV, 1868.

⁶⁾ Cloëz und Cahours, Liebigs Ann. 90, 91.

⁷⁾ Weith und Schröder, Berichte deutsch. chem. Gef. VII, 946.

⁸⁾ A. W. Hofmann, Berichte deutsch. chem. Gef. II, 460 u. 687.

Nach dieser Methode ist eine große Zahl zweifach-substituierter Guanidine erhalten, deren Aufzählung ich hier unterlasse. Den Gang der Reaction habe ich schon Seite 14 nach W. Weith entwickelt. Selbstverständlich kann man nach dessen Vorgang die Bildung in zwei Theile zerlegen (durch successive Behandlung des substituirten Carbodiimid mit Ammoniak). Steiner hat, wie das einfache Guanidin (Seite 18) auch das symmetrische Diphenylguanidin aus Knallquecksilber und Anilin dargestellt.¹⁾ Von Interesse ist noch die Gewinnung des gleichen Körpers durch Forster.²⁾ Er liess auf Monophenylsulfoharnstoff Mercuridiphenylammoniumchlorür einwirken und erwartete nun ein asymmetrisches Diphenylguanidin durch Austausch des Schwefels gegen (NC₆H₅) zu erhalten. Er bekam jedoch wieder das symmetrische. Dies wird befriedigend erklärt durch intermediäre Bildung von Carbomonophenylimid (und vielleicht auch Anilin), etwa:



Kurze Zeit schien es, als wären diese Guanidine unsymmetrische, da man glaubte, dass in den geschwefelten Harnstoffen das Schwefelatom einfach, das eine Stickstoffatom hingegen doppelt an Kohlenstoff gebunden sei. Nach den gründlichen Untersuchungen von Bernthsen und Will über die Constitution der geschwefelten Harnstoffe muss man jedoch bei den alten Anschauungen bleiben, wonach diese Körper symmetrische Structur besitzen.

Der Austausch der Imidgruppe des Melanilins gegen Sauerstoff, also die Ueberführung desselben in einen Harnstoff ist indirect erreicht. Nach Mc. Creath³⁾ entsteht nemlich durch Einwirkung von Essigsäureanhydrid auf Ersteres Monoacetylmo-

¹⁾ Steiner, Berichte deutsch. chem. Ges. VII, 1244.


²⁾ Forster, ib. VII, 294 und Liebigs Ann. 175, 35.

³⁾ Mc. Creath, Berichte deutsch. chem. Ges. VIII, 1181.

nophenyl- und Monoacetyldiphenylharnstoff. Ferner geht die Cyan-, sowie die Oxalylverbindung des Melanilins beim Kochen mit Salzsäure in Oxalyl-diphenylharnstoff (Diphenylparabansäure) über. Das Nähere f. u. Die Rückverwandlung des Melanilins in Sulfocarbanilid führte A. W. Hofmann ¹⁾ durch vermittelt Erhitzen mit Schwefelkohlenstoff.

Wir kennen auch noch unsymmetrisch-zweifach substituirte Guanidine, der Formel IV. (S. 27) entsprechend. Tatarinoff ²⁾ erhielt Dimethylguanidin $\text{CN}_2\text{H}_3\text{N}(\text{CH}_3)_2$ aus salzsaurem Dimethylamin und Cyanamid. E. Erlenmeyer ³⁾ erwähnt das entsprechende Diäthylguanidin.

In großer Zahl bekannt sind die dreifach substituirten Guanidine. Bei gleichen Substituenten sind 3, bei 2 gleichen und einem verschiedenen sind 6 und bei 3 ungleichen sind 9 Isomere denkbar:



Die dem Schema I. entsprechenden sind am Meisten bekannt und werden als α Verbindungen bezeichnet. Sie entstehen leicht, wenn man symmetrisch-zweifach substituirte Sulfonharnstoffe in Gegenwart von Aminen entschweifelt. So erhielt A. W. Hofmann α Triäthylguanidin aus Diäthylsulfonharnstoff und Äthylamin. ⁴⁾ Auch viele Analoga sind dargestellt; um nur das einfachste Glied der aromatischen Reihe zu nennen: das α Triphenylguanidin vom Schmelzpunkt 143°. ⁵⁾ Bei seiner Entdeckung nahm dieser Körper das besondere Interesse der Chemiker in Anspruch, weil er durch mehrere complicirte Re-

¹⁾ A. W. Hofmann, Berichte deutsch. chem. Ges. II, 460.


²⁾ Tatarinoff, ib. XII, 2270.

³⁾ Erlenmeyer, ib. XIV, 1869.

⁴⁾ A. W. Hofmann, ib. II, 600.

⁵⁾ Derf., ib. II, 453.

actionen erhalten war, die nicht sofort verstanden wurden, zumal man erst in jener Zeit und bei jener Gelegenheit die Guanidine und Sulfoharnstoffe, sowie die dabei in Betracht kommenden Senföle näher kennen lernte. Die Sache liegt heute so einfach, daß ich darauf nicht näher eingehe. Nachdem A. W. Hofmanns Carbotriphenyltriamin¹⁾ durch die Arbeiten von W. Weith²⁾ aus der Liste der Guanidine entfernt und als Diphenyl- p. Amidobenzenylamidin erkannt worden ist, bleibt noch ein Widerspruch zu lösen. Sell und Zierold erhielten aus Isocyanphenylchlorid und Anilin einen Isotriphenylguanidin genannten bei 207⁰ schmelzenden Körper,³⁾ der — wenn er wirklich ein Guanidin ist — auch nur nach Formel I. gebaut sein kann:



Die Untersuchung der Constitution dieses Körpers erscheint daher wünschenswerth.

Noch eine ganze Reihe von Methoden zur Darstellung des α Triphenylguanidins ist bekannt, deren Aufzählung ich aber unterlasse. Nur zwei recht hübsch bunt zusammengestellte symmetrisch-dreifach substituirt Guanidine seien noch erwähnt. U. Forster erhielt durch Kochen von Aethylallylsulfoharnstoff mit Mercuridphenylammoniumchlorür Aethylallylphenylguanidin,⁴⁾ während F. Tiemann durch Entschwefelung von Phenyltolylsulfoharnstoff in Gegenwart von Naphtylamin Phenyltolyl-naphtylguanidin⁵⁾ gewann. Merz und Weith führten das α Triphenylguanidin durch Erhitzen mit Wasser oder Destilliren im Kohlen säurestrom in Carbanilid,⁶⁾ durch Behandeln mit

¹⁾ A. W. Hofmann, Jahresber. für Chemie etc. 1858, 351.

²⁾ W. Weith, Berichte deutsch. chem. Ges. X, 358; 402; XII, 101.

³⁾ Sell und Zierold, ib. VII, 1231.

⁴⁾ Forster, Liebigs Ann. 175, 41.

⁵⁾ Tiemann, Berichte deutsch. chem. Ges. III, 7.

⁶⁾ Merz und Weith, ib. III, 25.

Schwefelkohlenstoff in Sulfocarbanilid und Phenylsenföl¹⁾ über. Die Einwirkung von Schwefelwasserstoff lieferte ihnen neben Sulfocarbanilid Anilin. Einige Jahre später stellte W. Weith in Gemeinschaft mit B. Schröder²⁾ aus Phenylcyanimid und Diphenylamin das β Triphenylguanidin (Schmelzpunkt 131°) dar, das mit Schwefelkohlenstoff Phenylsenföl und Diphenylamin liefert. Seiner Bildung gemäß ist es vermuthlich nach Formel II. (Seite 30) constituirt. Auch die Zersetzung spricht dafür.

Von den vierfach substituirtten Guanidinen die (bei gleichen Substituenten) nur in einer symmetrischen und einer asymmetrischen Form vorkommen können, ist das symmetrische Tetraphenylguanidin fast der einzige bekannte Repräsentant. W. Weith³⁾ erhielt es durch Einwirkung von Chlorcyan auf Diphenylamin. Durch Erhitzen mit Kalilauge wird es in Kohlensäure, Ammoniak und Diphenylamin gespalten. Neuerdings ist es von A. Bernthsen und G. Frieße⁴⁾ vermittelst Schwefelkohlenstoff in Tetraphenylthioharnstoff umgewandelt. Entstehung wie Zersetzung weisen auf die Structur $\text{CNH}[\text{N}(\text{C}_6\text{H}_5)_2]_2$ hin. D. Mc. Creath⁵⁾ hat durch Erhitzen von Diphenylguanidin mit Benzoesäureanhydrid Dibenzoyldiphenylguanidin erhalten, dem man wohl auch die symmetrische Structur zuschreiben darf, da, wenn die erste Benzoylgruppe an den doppelt gebundenen Stickstoff getreten wäre, entweder gar keine oder zwei weitere im Molecül hätten Platz finden müssen.

Derselbe Chemiker hat (l. c.) auf gleiche Weise aus Triphenylguanidin und Benzoe- bzw. Essigsäureanhydrid Dibenzoyl- resp. Diacetyltriphenylguanidin erhalten. Sie können nur symmetrisch constituirt sein. Es sind bis jetzt die einzigen Re-

¹⁾ Vergl. Hobrecker, Berichte deutsch. chem. Ges. II, 689.


²⁾ Weith und Schröder, ib. VIII, 294.

³⁾ Weith, ib. VII, 843.

⁴⁾ Bernthsen und Frieße, ib. XV, 1531.

⁵⁾ Mc. Creath, ib. VIII, 383.

präsentanten der fünffach substituirtten Guanidine. Da nach Bernthsen und Friebe (l. c.) der Tetraphenylthioharnstoff durch Quecksilberoxyd nicht entschwefelt wird (was man nach Weith's Untersuchungen über das Carbodiphenylimid voraussehen konnte, weil die typischen Wasserstoffatome fehlen — eine neue Befätigung jener geistreichen Erklärung), so darf man nicht erwarten, auf dem Wege, welcher uns zu den zweifach und dreifach substituirtten Guanidinen geführt hat und uns hoffentlich auch noch zu den einfach substituirtten führen wird, nemlich durch Austausch des Schwefels der Thioharnstoffe gegen die Imidgruppe, die fünffach substituirtten zu erreichen. Ebenso sind die Chancen für die Gewinnung der vierfach substituirtten — etwa durch Einwirkung secundärer Amine auf Carbodiimide — gering, da sich die Radicale zu schwer vom Stickstoff lösen, etwa:



Diese Zusammenstellung möge zur allgemeinen Charakteristik der Guanidine genügen.

Ich wende mich zwecks Erläuterung einiger von mir dargestellten Körper noch kurz zu eigenthümlichen Derivaten zweifach und dreifach substituirtter Guanidine.

D. Cyanguanidine.


Im Jahre 1848 behandelte A. W. Hofmann Anilin, Toluidin und Cumidin mit Cyangas ¹⁾. Statt der erwarteten Substitutions- erhielt er Additionsproducte von der Rohformel $\text{C}_8\text{H}_7\text{N}_2$ bez. $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{N}_2$ und $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{N}_2$, die später von Wislicenus ²⁾ verdoppelt wurde und als $\begin{array}{c} \text{C} \equiv (\text{NH}) (\text{NHR}) \\ \text{C} \equiv (\text{NH}) (\text{NHR}) \end{array}$ entwickelt ist. Ebenso erklärt — anscheinend ohne Kenntniß dieser Angabe — A. Bernthsen ³⁾ diese Körper als Amidine der Oxalsäure

¹⁾ A. W. Hofmann, Liebigs Ann. 66, 129.

²⁾ Strecker-Wislicenus, Lehrbuch der organischen Chemie, VI. Aufl. p. 887

³⁾ Landgrebe Inaug.-Diff. Göttingen. 1878 (Berlin): Ueber Verbindungen des Cyans mit organischen Basen.

(s. o.). Einige auf gleiche Weise gewonnene Körper hat O. Landgrebe ¹⁾ aufgeführt. Bei der Fortsetzung seiner Bemühungen, ein Cyan-substituirtes Anilin zu erhalten, gelangte Hofmann ²⁾ — ebenfalls wider Erwarten — zum Melanilin und auch dieses zeigte die Fähigkeit, mit Cyan eine additionelle Verbindung einzugehen, nur dafs hier 1 Molecül mit 1 Molecül reagierte (oben 1 Mol. (CN)₂ mit 2 Mol. C₆H₇N), weil das Melanilin 2, das Anilin hingegen nur eine Amidgruppe enthält. Man kann den Vorgang derart auffassen, dafs sich in jeder Amid-Hälfte des Cyanmolecüls eine Bindung zwischen Kohlenstoff und Stickstoff löst und jedes Kohlenstoffatom dann ein Stickstoff-, jedes Stickstoff- ein Amidwasserstoffatom attrahirt: (Die verbindende Klammer bedeutet, dafs die beiden durch R angedeuteten Valenzen einem gemeinsamen Radical angehören dürfen).



Demgemäfs unterscheidet sich die Wirkung des Cyans auf Anilin von der auf Melanilin in theoretischer Bedeutung nicht und ebenfowenig von der auf Benzidin, wobei sich 1 Mol. Cyan mit 1 Mol. Benzidin vereinigt ³⁾, wie auch nicht von der auf gewöhnliche oder geschwefelte Harnstoffe. Nencky gewann aus 1 Mol. Cyan und 1 Mol. Malonylharnstoff Cyanmalonylharnstoff ⁴⁾ C₄H₄O₃N₂ + 2 CN = C₆H₄O₃N₄, während R. Maly ⁵⁾ analog Cyanthiofinnamin, Cyanallylphenylthioharnstoff und Cyanallyltolythioharnstoff erhielt. Interessant verwerthet

¹⁾ Landgrebe Inaug.-Diff. Göttingen, 1878 (Berlin): Ueber Verbindungen des Cyans mit organischen Basen.

²⁾ A. W. Hofmann, Liebigs Ann. 67, 129.


³⁾ Wittenstein, Berichte deutsch. chem. Ges. III, 723.

⁴⁾ Nencky, ib. V, 886.

⁵⁾ Maly, Zeitschrift für Chemie 1869, 259 u. 261; Jahresber. für Chemie etc. 1869, 636.

ist diese Methode neuerdings von R. Andreaesch ¹⁾. Derselbe stellte Cyanmono- und Cyandimethylthioharnstoff dar, tauschte (nach einer gleich zu erwähnenden allgemeinen Reaction) die Imidgruppen und den Schwefel gegen Sauerstoff aus und erhielt so Spaltungstücke des Cafféins und Theobromins, die schon länger bekannte Methylparaban Säure und das Cholestrophan (Dimethylparaban Säure). Es sei noch auf die schon Seite 6 erwähnten aus Cyan und Ammoniak erhaltenen Körper hingewiesen, sowie auf die Producte aus Cyan und Ortho-, resp. Metaamidobenzoë Säure von Griess ²⁾. Im Uebrigen beschränke ich mich auf die mit meiner Experimentalarbeit zusammenhängenden Verbindungen.

Wie schon erwähnt, gewann A. W. Hofmann aus Diphenylguanidin und Cyan Dicyandiphenylguanidin (Dicyanomelamin). Er wandelte dasselbe durch Behandlung mit Salzsäure in der Kälte in Diphenyloxalylguanidin, durch Behandlung in der Hitze in Diphenylparabansäure ³⁾ um, indem zuerst die an Cyankohlenstoffatome gebundenen Imidgruppen und später auch die des Guanidins gegen Sauerstoff ausgetauscht wurden:



Die Reaction findet — wie erwähnt — allgemein statt. Beim Erhitzen mit Alkalien spalten die Oxalylguanidine ihre Oxalylgruppen in Form der Oxalate ab; die Paraban Säuren zerfallen bei dieser Behandlung in Kohlen Säure, Amin und Oxal Säure.

Ebenso wie die zweifach-, verhalten sich die dreifach substituirten Guanidine. Z. B. liefert α Triphenylguanidin ⁴⁾ sog. α Dicyantriphenylguanidin, Triphenyloxalylguanidin und

¹⁾ Andreaesch, Berichte deutsch. chem. Gef. XIV, 1447.

²⁾ Griess, Berichte deutsch. chem. Gef. II, 415; XI. 1986. Griess und Leibius, Liebigs Ann. 113, 332 u. a. and. O. cf. Correctur: Berichte deutsch. chem. Gef. XVI. 336.

³⁾ A. W. Hofmann, Jahresber. für Chemie etc. 1861, 529.

⁴⁾ Derf., Berichte deutsch. chem. Gef. III, 764.

Diphenylparabansäure, indem der hier an Stelle der Imidgruppe stehende Atomcomplex (NC_6H_5) gegen Sauerstoff ausgetauscht wird.

Bei der Einwirkung von Cyan auf Anilin hatte Hofmann in geringer Menge einen dem α Dicyantriphenylguanidin isomeren Körper beobachtet, das β Dicyantriphenylguanidin ¹⁾. Diesen gewann O. Landgrebe auch durch Erhitzen von Dicyandiphenyl- oder α Dicyantriphenylguanidin mit Anilinchlorhydrat ²⁾. Er entsteht durch Umlagerung, wenn salzsaures Toluidin auf die isomere α Verbindung einwirkt. Die gleiche Umlagerung konnte ich in der β Naphtylreihe mittelst Anilin bewirken (s. u.). Der β Körper geht durch Kochen mit Alkohol unter starkem Druck, sowie mit Säuren in Diphenylparabansäure über. Alkalien greifen ihn nicht leicht an, zersetzen ihn aber bei starker Einwirkung in Oxalsäure, Kohlensäure, Anilin und Ammoniak.

Die Interpretationen dieser Körper, welche Landgrebe ³⁾ gibt, kann ich nicht anerkennen. Dem α Dicyantriphenylguanidin kommt, wie Landgrebe ganz richtig bemerkt, seiner Entstehung nach folgende Constitution zu:



Doch will er die isomere β Verbindung so gebaut wissen, während er für jene dann keine Formel aufzustellen weis. Als Gründe gibt er an: 1) die leichte Ueberführbarkeit der α - in die β -Körper; 2) dass aus den α -Körpern keine vierfach substituirten Cyanguanidine entstehen; 3) dass die α -Körper leicht in die Oxalylverbindung, schwieriger und nur indirect (!?) in die Parabansäuren übergehen, dass demnach 2 Imidgruppen weniger fest als die dritte gebunden sein müssten; 4) dass

¹⁾ A. W. Hofmann, Berichte deutsch. chem. Ges. III, 764.

²⁾ O. Landgrebe, ib. X, 1587.


³⁾ Derf., ib. XI, 973 und Inaug.-Diff. (Schluss).

die β -Körper nur Paraban Säuren, keine Oxalylverbindungen liefern, demnach die 3 Imidreste gleichmäfsig stark gebunden sein müßten; 5) dafs seine Formel für das β Cyanguanidin die Aehnlichkeit desselben mit dem Cyananilin betr. die Beständigkeit gegen Alkalien erkläre; 6) dafs dadurch auch die Entstehung des Ersteren aus dem Letzteren begreiflich erscheine.

Auf Grund dieser Erwägungen verwirft er die naheliegende Formel $\text{HN}=\text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{N}(\text{C}_6\text{H}_5)\text{CNH} \\ \searrow \text{N}(\text{C}_6\text{H}_5)\text{CN}(\text{C}_6\text{H}_5) \end{array}$ für das β Dicyantriphenylguanidin, welche ich für die richtige halte. Einerseits scheinen mir die Formeln in seiner Auffassung nichts besser zu erklären, als in der anderen und zweitens scheinen manche seiner Gründe nicht auf Thatfachen zu beruhen.

Ad 1) Die Ueberführbarkeit der α in die β Verbindung wird durch die eine Formel so wenig erklärt, wie durch die andere. Das Radical — vielleicht in stetem Zusammenhang mit Stickstoff — wandert an eine andere Stelle im Molecül. Auf tiefergehende Speculation verzichte ich, weil ihr jede Unterlage fehlt. Ad 2) Es ist durchaus nicht nöthig, dafs die schon ziemlich grossen Molecüle der α -Körper noch ein Radical aufzunehmen fähig sind. Im Gegentheil ist gar nicht ausgeschlossen, dafs die $\{\text{N}(\text{C}_6\text{H}_5)\}^n$ Gruppe den Imidgruppen etwaige Disposition benimmt. Ad 3) Der leichtere Uebergang in die Oxalylverbindungen, der schwierigere in die Paraban Säuren wird durch die von Landgrebe verworfene Formel erklärt. Die eine Imidgruppe ist ganz verschieden von den 2 anderen gebunden, und daher ein verschiedenes Verhalten schon wahrscheinlich. Ein Durchgang der α durch die β Cyanguanidine bei ihrer Verwandlung in Paraban Säuren findet wohl kaum statt. Bekanntlich ist die Ausbeute an Paraban Säure in Folge nebenherlaufender Proceffe sehr gering und auf einen solchen ist wohl die Bildung von β Cyanguanidin zurückzuführen. Vermuthlich wird das Ausgangsmaterial theilweise bis zum Amin gespalten und dieses bildet mit unverändertem


Cyanguanidin β Cyanguanidin und bei weiterem Kochen ebenfalls Parabanfäure. Man kann ja auch die Parabanfäure aus den Oxalylverbindungen erhalten, wobei ein „Durchgang durch die β Cyanguanidine“ ausgeschlossen ist. Ad 4) Landgrebe's Formel für die β Cyanguanidine schließt die Bildung von Oxalylguanidinen nicht aus und weist durchaus nicht „3 gleichmäfsig stark gebundene Imidreste“ auf, wie ich schon bei Nr. 3 bemerken konnte. Der Grund spricht also nur gegen ihn. Hingegen erklärt die andere Auffassung, weshalb die β Cyanguanidine überhaupt die Berührung mit Säuren ertragen: statt der empfindlichen Gruppe $\text{CNI}—\text{CNH}$, steht eine andere $\text{CNH}—\text{CNR}$, welche wohl beständiger sein kann. Ferner wird durch dieselbe begreiflich, weshalb die Oxalylguanidine nicht entstehen: die Abspaltung kann nur durch so energische Behandlung bewirkt werden, dafs die Reaction sofort tiefer durchgreift und alles Bewegliche aus dem Molecül gleichsam heraus schleudert. Ad 5) Die eine Formel hat mit der des Cyananilins kaum gröfsere Aehnlichkeit, als die andere und auch — wenn dieselbe vorhanden wäre, würde dadurch nichts bewiesen. Ad 6) Das β Cyanguanidin entsteht vermuthlich nicht aus, sondern neben dem Cyananilin. Seine Bildung kann einfach erklärt werden durch Zusammentritt von Cyan und Anilin zu Melanilin, (ähnlich der Entstehung des Letzteren aus Anilin und Chloreyan), welches dann successive mit Cyan und Anilin reagirt (Es soll aber nur die Möglichkeit dieses Vorganges ausgesprochen sein):




Für die — nicht aufgelöst gegebene — Reactions-
gleichung von Landgrebe finde ich keine einfache und ungezwungene Erklärung:




Danach scheint mir für die α Cyanguanidine die Formel



die einzig mögliche, besonders nach ihrer Synthese. Aber ich weiß auch keinen Grund, für die β Cyanguanidine die Formel



zu verwerfen. Dieselbe steht weder mit ihrer Entstehung, noch mit ihrer Beständigkeit, noch mit ihren Umwandlungen in Widerspruch. Letztere schliessen übrigens aus, daß 2 Radicale direct an dasselbe Stickstoffatom gebunden sind. Diesen Bedingungen würde noch folgende Formel genügen, durch welche auch die von Landgrebe und mir beobachtete Umlagerung erklärt würde:



Dieselbe besitzt jedoch im Allgemeinen so wenig innere Wahrscheinlichkeit, daß ihre Discussion unangebracht erscheint.

II.

Experimenteller Theil.

Die im Folgenden zu beschreibenden Untersuchungen wurden unternommen, um die Constitution der eben besprochenen und kurz als β Cyanguanidine bezeichneten Körper aufzuklären, welche O. Landgrebe vor einigen Jahren zuerst ausführlicher bearbeitet hat.

Leider gelang es mir nicht, dieselben in so umfassender Weise kennen zu lernen, wie ich gewünscht hätte. Sie sind einerseits zu wenig durch Gestalt und Schmelzpunkt characterisirt, während andererseits ihre Löslichkeit und der innere moleculare Zusammenhang recht schwach sind. Um sie zu reinigen, muß man sie daher anhaltend kochen, ohne ihre Zersetzung vermeiden zu können, und wiederum ist es schwer, diese oder die einheitliche Natur der Substanz zu constatiren wegen der Abwesenheit sicherer Kennzeichen.

Ein Blick auf die Formeln der untersuchten Körper lehrt die Ursache dieser unangenehmen Eigenschaften. Das Guanidin selbst und noch mehr die davon abgeleiteten Cyanguanidine zeichnen sich schon im Allgemeinen nicht durch große Beständigkeit aus. Nun sind die Körper, hier durch je 2 oder 3 Naphtalinreste belastet, so daß sie alle mehr als 20 Atome Kohlenstoff, daneben noch einige Stickstoff — die wesentlich an der Verkettung betheiligt sind und hier leicht den Dienst versagen — und entsprechend Wasserstoff enthalten. Daß solche Molecüle, deren Gewicht 300 Einheiten immer weit

übersteigt, keine bedeutende Stabilität besitzen, darf nicht übersehen.

Ich mußte schon bei der

Einwirkung von Cyangas auf β Naphtylamin diese üble Erfahrung machen. Wie erwähnt, verbindet sich Cyan leicht mit den Aminen der Phenylreihe. Es entstehen Cyananilin und seine Homologen, richtiger die substituirten Oxamidine. Als ich ganz analog Cyangas in eine alkoholische Lösung von 5 gr. β Naphtylamin leitete, blieb die erwartete Reaction aus und erst nach längerem Stehen zeigte sich eine geringe, sich beständig, aber wenig vermehrende Quantität eines rothen Körpers. Im Uebrigen war das Naphtylamin unverändert geblieben, wie am Aussehen und Schmelzpunct der Masse leicht erkannt wurde. Dinaphtyloxamidin $C_{22}H_{18}N_4$ konnte nicht in Substanz nachgewiesen werden.

Der erwähnte rothe Körper wurde aus Aceton umkrystallisirt und schien nach Form, Farbe, Schmelzpunct und Löslichkeit in Alkohol und Aceton das unten ausführlicher zu behandelnde β Dicyantrinaphtylguanidin zu sein. Die Analysen wurden mit verschiedenen Fractionen ausgeführt.

0,1470 gr. lieferten 0,3905 gr. $CO_2 = 0,1065$ gr. $C = 72,45\%$ C und 0,0705 gr. $H_2O = 0,0078$ gr. $H = 5,36\%$ H. 0,1515 gr. gaben bei $18,5^\circ C$ und $761,2^{mm}$ B. $17,9^{cem}$ N = $13,93\%$ N.

Berechnet für	Gefunden	Berechnet für
$C_{33}H_{23}N_5 + 3 aq:$	:	$C_{33}H_{23}N_5:$
$C_{33}: 396: 72,9\%$	$C = 72,45\%$	$C_{33}: 396: 80,98\%$
$H_{23}: 29: 5,39\%$	$H = 5,36\%$	$H_{23}: 23: 4,7\%$
$N_5: 70: 12,9\%$	$N = 13,93\%$	$N_5: 70: 14,3\%$
$O_3: 48: 8,8\%$	.	.

Nun geben allerdings A. W. Hofmann und O. Landgrebe an, daß die Phenylblase nur $1/2$ Molecül Kry stallwasser enthalte und ich fand in dem bei gleicher Temperatur getrockneten β Dicyantri β naphtylguanidin kein Kry stallwasser. Aber

die zur Analyse zur Verfügung stehende Substanz war so gering, daß man keine sichern Werthe erwarten darf. Die Analogie der Reaction in Phenyl- und Naphtylreihe scheint mir festgestellt bez. der Bildung des β Cyanguanidins. Im Uebrigen habe ich dies nur angeführt, um zu zeigen, wie schwierig die Naphtalinkörper sich diesen Reactionen gegenüber verhalten.

Das Ausgangsmaterial für die Gewinnung der nun zu beschreibenden Körper ist der von C. Cofner¹⁾ aufgefundenen Dißnaphtylsulfoharnstoff. Den bezüglichlichen Angaben habe ich nichts von Bedeutung hinzuzufügen. Der Körper bildet sich sehr leicht — sogar in der Kälte —, man kann die alkoholische Mutterlauge mehrfach anwenden und reinigt das Product am besten durch Auswaschen mit kaltem Alkohol. Nur die letzten Reste müssen mit Weingeist ausgekocht werden. Die Ausbeute beträgt nahezu 90 % der theoretischen und könnte noch gesteigert werden, was aber bei der Wohlfeilheit des Naphtylamins keinen Vortheil bringt. Die Löslichkeit des Körpers ist allerdings sehr gering. Jedoch wird er von Alkohol soweit aufgenommen, daß die Entschwefelung in einigermaßen befriedigender Weise gelingt.

Carbodißnaphtylimid.

Dieser Körper verdient einiges Interesse als das Mittelglied zwischen dem Sulfoharnstoff und dem Guanidin. Ich suchte ihn nach der Weith'schen Methode darzustellen, indem ich jenen nebst gefälltem Quecksilberoxyd in Benzol suspendirte und dies mehrere Stunden unter Rückfluskkühlung kochte. Es trat zwar eine geringe Schwärzung ein. In diesem Falle war jedoch die Entschwefelung nicht soweit gelungen, um das Imid isoliren zu können. Es waren nur Spuren desselben entstanden. Ich versuchte die Darstellung dann nach W. Will,²⁾ indem ich Jodäthyl auf Sulfoharnstoff einwirken ließ. Es entstand eine wohl characterisirte, gut krySTALLISIRENDE Base,

¹⁾ Cofner, Berichte deutsch. chem. Ges. XIV, 61.

²⁾ W. Will, ib. XIV, 1489.

das β Naphtylimido β naphtylcarbaminthioethyl C (N C₁₀ H₇) (NHC₁₀ H₇) (SC₂H₅), die schon bei gewöhnlicher Temperatur Mercaptan abspaltet und wegen ihrer sehr geringen Löslichkeit sich nicht umkrySTALLISIREN läßt (aus Alkohol gewann ich die KrySTALLE nur ganz verharzt wieder), die aber in Form ihres jodwasserstoffsauren Salzes leicht gereinigt werden kann. Der an sich interessante Körper bot für diese Arbeit zu wenig Interesse, als daß ich seine Analyse hätte vornehmen sollen. Bei seiner Verarbeitung zeigten sich die oben erwähnten Uebelstände. Die entsprechenden Phenyl- und Tolylbasen¹⁾ gehen durch Destillation leicht in die resp. Carbodiimide über. Dieser dagegen verkohlt bei etwa 190° zum größten Theile und auch bei 150° bleibt dies nicht ganz aus. Als ich den Thioimidoäther einen Tag lang auf letztere Temperatur erhitzt hatte, war zwar beständig Mercaptan entwichen. Dies fand jedoch auch weiter statt und das Reactionsproduct stellte nicht die Gewinnung des gewünschten Körpers in Aussicht. Ich stand deshalb auch von diesem Versuche ab.

symm. Di β naphtylguanidin C₂₁H₁₇N₃ = CNH(NHC₁₀H₇)₂.

20 gr. des entsprechenden Thioharnstoffs wurden mit überschüssigem (20 gr.) Bleiacetat in 250 gr. 96% Weingeist, während durch ein unten erweitertes Rohr beständige Zufuhr von Ammoniakgas stattfand, erhitzt. Nach 2–3 stündigem Kochen wurde Letztere abgeschnitten, die belästigende Gasmenge noch zum Theil abgetrieben und dann heiss vom Unlöslichen (größtentheils Bleisulfid und -oxyd, sowie unangegriffenem Sulfoharnstoff) abfiltrirt. Die Entschwefelung gelingt leicht, aber nie ganz vollständig. Das Filtrat enthält etwas Harz und giebt deswegen nur geringe KrySTALLMENGEN. Man dampft es deshalb am Besten mit wässriger Salzsäure ab und zieht den festen Rückstand mit heissem Wasser aus. Daraus scheidet man durch Aufkochen mit Natronlauge das entstandene Gua-

¹⁾ Will und Bielschowsky. Berichte deutsch. chem. Ges. XV. 1310.

nidin ab und erhält es dann nach mehrmaligem Umkrystallisiren rein.

Dißnaphtylguanidin bildet blumenkohlartig gruppirte, nicht deutlich erkennbare, aber anscheinend dem hexagonalen System angehörige Prismen. Es schmilzt bei 194° C. Es ist fast unloslich in Wasser, wenig löslich in Aether, etwas in kaltem, ziemlich leicht in heißem Alkohol, sehr leicht in Eisessig, auch schon in verdünnter Essigsäure. Mit Säuren bildet es Salze und verhält sich dabei als einsäurige Base.

0,2560 gr. ergaben 0,7640 gr. $\text{CO}_2 = 0,2084$ gr. C = $81,41\%$ C und 0,1340 gr. $\text{H}_2\text{O} = 0,0149$ gr. H = $5,82\%$ H.

0,3034 gr. ergaben bei 760^{mm} B. und 22° C $37,2^{\text{abem}}$ N = $13,89\%$ N.

Berechnet für $\text{C}_{21}\text{H}_{17}\text{N}_3$:

Gefunden:

C_{21} : 252: $81,03\%$

C: $81,41\%$

H_{17} : 17: $5,47\%$

H: $5,82\%$

N_3 : 42: $13,50\%$

N: $13,89\%$

Ferner hinterliessen 1,0640 gr. des Platindoppelsalzes 0,2015 gr. Platin.

Berechnet für (Pt = 194,5):

Gefunden:

$(\text{C}_{21}\text{H}_{17}\text{N}_3)_2 \text{H}_2\text{Cl}_6\text{Pt}$

Pt: $18,86\%$

Pt = $18,94\%$

Das Platinsalz war in schönen, gelben Kry stallen gewonnen, indem eine verdünnte alkoholische Lösung des Guanidinchlorhydrats mit Platinchlorid versetzt wurde. Alsdann fiel das Chloroplatinat aus.

Dicyandißnaphtylguanidin $\text{C}_{23}\text{H}_{17}\text{N}_5 = \text{CNH}(\text{NC}_{10}\text{H}_7\text{CNH})_2$.

5 gr. Dißnaphtylguanidin werden in Aether fein zertheilt und in die etwas gekühlte Mischung Cyangas geleitet. Man läßt einige Stunden in wohl verkorkter Flasche stehen und filtrirt dann ab. Der Aether enthält darauf fast gar keine feste Substanz. Die Einheitlichkeit des Körpers ist nicht sicher nachzuweisen, da er nicht umkrystallisirt werden darf und auch keinen scharfen Schmelzpunct besitzt. Es spricht je-

doch dafür der leichte Uebergang in das Oxalylguanidin cf. pg. 46. Dicyandiβnaphtylguanidin ist undeutlich kryftallinifch, von gelber Farbe, die durch Zerfetzung ins Grünliche übergeht, es zerfetzt fich zwischen 150° und 175° , löst fich in Salzfäure, aber fetzt fich damit fofort unter Rothfärbung um. Im Alkohol ift es ziemlich fchwer löslich, fällt daraus nur fchlecht aus; es wird am Beften im ganz rohen Zuftand analyfirt und verarbeitet.

0,2360 gr. ergaben bei $758,5^{\text{mm}}$ B und $23,6^{\circ}$ C : $40,2^{\text{cem}}$ N = $19,199\%$ N.

Berechnet für $\text{C}_{23}\text{H}_{17}\text{N}_5$: Gefunden:

$\text{N}_5 : 70 = 19,283\%$ N = $19,199\%$

Diβnaphtyloxalylguanidin $\text{C}_{23}\text{H}_{15}\text{N}_5\text{O}_2$.

Der vorige Körper wurde mit concentrirter wäfferiger Salzfäure in gelinder Wärme digerirt, das Product abfiltrirt und mit kaltem Waffer bis zum Aufhören der fauren Reaction gewafchen. Es war in Aether faft gar nicht löslich, in Alkohol fchwer, aber kryftallifirte daraus in gelblich-weißen Flittern, die bei 231° — 238° etwa fchmolzen. Die gefundenen analytifchen Refultate C = $71,78\%$; H = $4,04\%$; N = $8,8\%$ und = $8,93\%$ laffen keine Interpretation finden, fo dafs fich der Körper beim Umkryftallifiren wahrſcheinlich zerfetzt hat. Von einer Wiederholung dieſes Verſuches ſtand ich ab, da das Umkryſtalliſiren zu ſchwierig und ja auch vermuthlich ſchädlich war. Ich verſuchte vielmehr dieſes zu vermeiden, indem ich das obige Cyanguanidin in Alkohol löſte und in der Kälte mit Salzfäure verſetzte. Ich durfte dann hoffen, das Oxalguanidin in genügender Reinheit ausfallen zu ſehen. Es ſchied ſich jedoch nur eine geringe Quantität aus, während in der Flüſſigkeit Oxalſäure aufgefunden wurde und daraus groſſe Maſſen von Dinaphtylguanidin gewonnen werden konnten. Die Salzfäure hatte alſo die addirte Gruppe $(\text{CNH})_2$ nicht blos verſeift, ſondern auch abgeſpalten. Der Verſuch wurde daher wiederholt unter Anwendung verdünnter Schwefelſäure ſtatt

der Salzfäure. Bald fielen schön glänzende, matt-rofa Kryftallblättchen aus, welche nach dem Wafchen mit Alkohol und mit Waffer fofort — um Zerfetzungen vorzubeugen — analyfirt wurden. Aber es wurde wieder kein befriedigendes Refultat erhalten, ($C = 62,97\%$; $H = 5,37\%$; $N = 8,07\%$). Alsdann wurde der Verfuch unter Anwendung von Eiffeffig als Verfeifungsmittel wiederholt; es refultirte eine wenig Vertrauen erweckende röthliche Maffe, die in Waffer, Alkohol, Aether, Benzol und Schwefelkohlenftoff wenig oder gar nicht löslich war, durch Kochen mit Eiffeffig zwar gelöst, aber anfeheinend zerfetzt wurde. Von Aceton wurde fie leicht aufgenommen, aber fo abgefchieden, dafs fie keine Analyfe werth fchien (wahrfcheinlich war fie β Dicyantrinaphtylguanidin).

Ich kam deshalb auf die erfte Methode zurück. Um den Procefs möglichft fchnell und doch gründlich durchzuführen, trug ich die Subftanz feingepulvert in rauchende Salzfäure ein, fehüttelte fie damit heftig, filtrirte das Produkt ab und wufch gut aus mit Waffer. Dann trocknete ich es bei 100° und analyfirte es.

Dißnaphtyloxalylguanidin ift weifs, undeutlich kryftallinifch, wenig löslich in Alkohol, fonft gar nicht, fchmilzt nicht fcharf bei 220° — 225° , bräunt fich fchon bei 205° . Bei Verbrennung II. verbrannte der Kohlenftoff unvollftändig.

I. 0,2435 gr. ergaben $23,2^{\text{com.}}$ N bei 14° C. und $754^{\text{mm.}}$ B.
N = $11,3\%$.

II. 0,2170 gr. lieferten 0,5670 gr. $\text{CO}_2 = 0,1546$ gr. C und 0,0848 gr. $\text{H}_2\text{O} = 0,0094$ gr. H = $4,33\%$ H.

III. 0,2170 gr. gaben 0,5978 gr. $\text{CO}_2 = 0,1630$ gr. C = $75,13\%$ C und 0,0880 gr. $\text{H}_2\text{O} = 0,0098$ gr. H = $4,52\%$ H.

Berechnet für	Gefunden:		
$\text{C}_{23} \text{H}_{15} \text{N}_3 \text{O}_2$:	I.	II.	III.
C_{23} : 276 : $75,6\%$	C : —	—	$75,1\%$
H_{15} : 15 : $4,1\%$	H : —	$4,3\%$	$4,5\%$
N_3 : 42 : $11,5\%$	N : $11,3\%$	—	—

Dißnaphtylparabanfäure $C_{23} H_{14} N_2 O_3$.

Dicyandißnaphtylguani.lin wurde in Alkokol gelöst und unter Kochen am Rückfluskühler wässerige concentrirte Salz-fäure zugefügt. Zuerst auftretende intensivrothe Färbung schwächte sich zu zartem Gelb ab. Dann wurde der Kolben-inhalt in viel kaltes Wasser gegossen, der ausgefallene Nieder-schlag abfiltrirt und ausgewaschen, darauf in Eisessig gelöst und mit verdünntem Weingeist ausgefällt.

Dißnaphtylparabanfäure bildet weisse sehr undeutliche Krytalle, ist nicht löslich in Wasser, wenig in Alkohol, leicht in Eisessig. Es schmilzt, nachdem es sich geschwärzt, bei un-gefähr 230^0 . Die Ausbeute betrug kaum 15% der theoretischen.

0,1540 gr. ergaben bei $17^0 C$ und 769,4^{mm.} B. 10,2^{cm.} N = 793% N.

Berechnet für $C_{23} H_{14} N_2 O_3$:

N_2 : 28 : 7,65%

Gefunden

N = 7,93%.

α Trißnaphtylguanidin $C_{31} H_{23} N_3 =$

$C(NC_{10} H_7)(NHC_{10} H_7)_2$

wurde dargestellt durch mehrstündiges Erhitzen von 20 gr. Dißnaphtylthioharnstoff, 10 gr. β Naphtylamin und überschüssigem (20 gr.) Bleioxyd in Alkohol auf dem Wasserbade, bis die weissen Flitterchen zum grössten Theil in der Flüssigkeit ver-schwunden waren. Die Letztere wurde abfiltrirt, der Rück-stand noch 2—3mal mit Alkohol ausgekocht und aus der Lösung das Guanidin durch Eindampfen gewonnen. Es ist nach etwa 3 maligem Umkrytallisiren rein. α Trißnaphtyl-guanidin bildet weisse, blumenkohllartig gruppirte Krytalle, schmilzt bei $172^0 C$, ist nicht löslich in Wasser, wenig in kaltem, ziemlich in heissem Alkohol und in Aether, leicht löslich in Eisessig, wird aber daraus durch Wasser gefällt. Bildet mit Säuren Salze (als einfäurige Base) und ein schön krytallisirendes, gelbes Platindoppelsalz.


0,2248 gr. Substanz ergaben 0,7048 gr. $CO_2 = 0,1922$ gr. C = 85,50% C und 0,1128 gr. $H_2O = 0,0125$ gr. H = 5,56% H.

0,2528 gr. lieferten 22,2^{ccm.} N bei 757^{mm.} B. und 25,5⁰ C = 9,72^{0/0} N.

Berechnet für $C_{31} H_{23} N_3$	Gefunden:
$C_{31} : 372 : 85,13\ 0/0$	C : 85,50 ^{0/0}
$H_{23} : 23 : 5,26\ 0/0$	H : 5,56 ^{0/0}
$N_3 : 42 : 9,61\ 0/0$	N : 9,72 ^{0/0} .

0,5593 gr. des Platindoppelsalzes ergaben 0,0850 gr. Platin = 15,197^{0/0} Pt.

Berechnet für :	Gefunden :
$(C_{31} H_{23} N_3)_2 H_2 Cl_6 Pt :$	
Pt. 194,5 : 15,154 ^{0/0}	Pt. = 15,197 ^{0/0} .



entsteht in gelben, harten, sich an die Gefäßwände anlagern- den Krusten, wenn Cyangas in Aether geleitet wird, der α Trißnaphtylguanidin in feiner Vertheilung enthält. Da es sich beim UmkrySTALLISIREN zersetzte, wurde es ohne jede weitere Behandlung getrocknet und analysirt.

α Dicyantrißnaphtylguanidin bildet gelbe, harte KrySTALLE, schmilzt bei 160⁰—161⁰, ist in Alkohol und Aether mäSSIG löslich.

0,2648 gr. Substanz ergaben 0,7839 gr. KohlenSäure = 0,2138 gr. C und 0,1158 gr. Wasser = 0,0129 gr. H d. i.: 80,74^{0/0} C und 4,88^{0/0} H.

0,2481 gr. lieferten bei 758,9^{mm.} B. und 16⁰ C: 29,5^{ccm.} N = 14,1^{0/0} N.

Berechnet für $C_{33} H_{23} N_5 :$	Gefunden :
$C_{33} : 396 : 80,98\ 0/0$	C = 80 74 ^{0/0}
$H_{23} : 23 : 4,7\ 0/0$	H = 4,88 ^{0/0}
$N_5 : 70 : 14,3\ 0/0$	N = 14,1 ^{0/0}

(α Imidoxalyltrißnaphtylguanidin.)

Bevor ich den vorigen Körpertheil analysirte, wollte ich ihn erst aus Alkohol umkrySTALLISIREN. Er wurde dadurch auch in seinem äußern Ansehen nicht verändert; allein die Ver-

brennung lieferte Zahlen, durch welche ein anderer Körper, als der erwartete, angezeigt wurde. Dieselben wiesen darauf hin, daß die eine Cyanimidgruppe durch Sauerstoff vertreten sei. Der neue Körper enthält also eine Oxalylgruppe, in welcher an Stelle des einen Sauerstoffatoms die Gruppe NH (Imid) steht. Indem ich dieselbe «Imidoxalyl-» nenne, finde ich die Bezeichnung für den ganzen Körper. Derselbe bildet das Zwischenglied zwischen den besprochenen Cyan- und Oxalylverbindungen, das in anderen Reihen noch nicht aufgefunden wurde:



Seine Entstehung ist wohl durch die leichtere Zerfetzlichkeit dieser Naphtalinderivate verurfacht.

α Imidoxalyltrißnaphtylguanidin $C_{33}H_{22}N_4O =$



Es entsteht durch längeres Kochen der alkoholischen Lösung der entsprechenden Cyanverbindung, von der es sich äußerlich nicht anders, als durch den Schmelzpunkt unterscheiden läßt. Derselbe liegt (nicht scharf) bei 166^0 (der des Cyankörpers bei 160^0 — 161^0).

Bei der Analyse verbrannte der Kohlenstoff nicht vollständig. Es ergaben 0,2229 gr. $0,6550$ gr. $CO_2 = 0,1786$ gr. $C = 80,12\%$ C und ferner $0,2136$ gr. $= 0,0950$ gr. $H_2O = 0,0106$ gr. $H = 4,96\%$ H.

$0,3231$ gr. ergaben bei $761,7^{mm}$. B und 18^0 C $32,5^{cm}$. $N = 11,64\%$ N.

$0,2278$ gr. ergaben bei $762,4^{mm}$. B und 18^0 C $22,75^{cm}$. $N = 11,57\%$ N.


Berechnet für $C_{33}H_{22}N_4O$:

Gefunden:

$C_{33} : 396 : 80,82\%$; $C = 80,12\%$

$H_{22} : 22 : 4,49\%$; $H = 4,96\%$

$N_4 : 56 : 11,43\%$; $N = 11,64\%$ u. $= 11,57\%$.




Eine alkoholische Lösung von α Dicyantri β naphtylguanidin wird kalt mit Salzsäure versetzt. Nach Kurzem beginnt eine krystallinische Ausscheidung des gefuchten Körpers. Man erhält cr. 80 % der theoretischen Ausbeute.

α Tri β naphtyloxalylguanidin ist farblos, krystallinisch, wenig löslich in Alkohol, nicht in Wasser und Aether. Mit Alkohol ausgekocht schmilzt es bei 226°.

0,2380 gr. ergaben bei 739,2 mm. B. und 16° C 17,7 cem. N = 8,59 % N.

Berechnet für $C_{33}H_{21}N_3O_2$: Gefunden:

N₃ : 42 : 8,55 %/o. N = 8,59 %/o.



Dieser Körper ist dem oben besprochenen Analogon in Bildung und Aussehen ganz gleich. Er entsteht 1) durch Kochen einer Lösung von Dicyandi β naphtylguanidin mit β Naphtylaminchlorhydrat (die freie Base wirkt aber nicht ein!) 2) durch Kochen einer Lösung von α Dicyantri β naphtylguanidin mit β Naphtylaminchlorhydrat, 3) durch Kochen einer Lösung von α Dicyantri β naphtylguanidin mit Anilinchlorhydrat. Bei Zusatz des Salzes färbt sich die Flüssigkeit schön carmoisinroth, man sieht, wie sich dieselbe mit einer voluminösen, feidenartig aussehenden Ausscheidung durchsetzt, kocht dann noch einige Minuten, setzt alkoholisches Ammoniak hinzu und kocht wieder kurze Zeit, damit man sicher ist, nur freie Base zu erhalten. Dann läßt man abkühlen und filtrirt ab. Nach zweimaligem Umkrystallisiren aus Aceton ist der Körper genügend rein.

β Dicyantri β naphtylguanidin scheint, wenn auch nur sehr undeutlich, zu krystallisiren. Es ist von gelb-rother Farbe, schmilzt über 205° allmählich, nachdem er sich zersetzt hat.

Es ist unlöslich in Wasser und Aether, in Alkohol ziemlich schwer löslich — und zersetzt sich beim Kochen mit demselben — in Eisessig ist es leicht löslich, wird aber auch von demselben angegriffen; in Aceton ist es ziemlich leicht löslich. Dasselbe dient am Besten zum Umkrystallisiren.

Die Substanz von Analyse I war nach der 1., die von Analyse II. nach der 3. Methode gewonnen.

I. 0,1714gr ergaben 0,5103gr $\text{CO}_2 = 0,1392\text{gr} = 81,21\%$ C und 0,0756gr $\text{H}_2\text{O} = 0,0084\text{gr} = 4,78\%$ H.

II. 0,2942gr ergaben 0,8717gr $\text{CO}_2 = 0,2378\text{gr} = 80,83\%$ C und 0,1292gr $\text{H}_2\text{O} = 0,0144\text{gr} = 4,89\%$ H.

Berechnet für	Gefunden:	
$\text{C}_{33}\text{H}_{23}\text{N}_5$:	I.	II.
C_{33} : 396 : 80,98%	C : 81,21%	: 80,83%
H_{23} : 23 : 4,7%	H : 4,78%	: 4,89%

Durch diesen Versuch wird bestätigt, daß wirklich α Cyan-guanidine unter der Einwirkung von gewissen Salzen in die β Cyanguanidine übergehen. Landgrebe hatte dies zwar behauptet, aber nicht durch eine unantastbare Analyse bewiesen. Er gab nur eine Platinbestimmung an, die auch für Substitution anstatt der Umlagerung gepaßt hätte. Das durch Umlagerung erhaltene β Dicyantriphenylguanidin schien zwar mit diesem identisch; es war aber nicht bis zur Evidenz nachgewiesen, daß es nicht das noch unbekannte β Dicyantolyldiphenylguanidin war. Das Resultat meiner Analyse II spricht jedoch lebhaft dagegen. Die Reaction des salzsauren Anilins auf Dicyandinaphthylguanidin erzeugte zweifellos β Dicyandinaphthylphenylguanidin. Es war aber nicht möglich, diesen Körper in reiner Qualität zu gewinnen.

Versuche zur Gewinnung des Mono β naphthyl-guanidin $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{N}_3$.

Wie oben erwähnt, sind die einfach substituirten Guanidine wenig bekannt, Ich habe in verschiedener Weise ihre Gewinnung erstrebt. Die bezüglichen Versuche gingen mit Aus-

nahme des letzten von Cofiners ¹⁾ Mono β naphthylthioharnstoff aus.

Verfuch I. Nach Feuerleins Angaben (cf. Seite 26) entschwefelte ich 10gr des Mono β naphthylsulfoharnstoffs in alkoholisch-kalischer Lösung mit Bleioxyd unter Einleiten von trockenem Ammoniakgas. Es resultirten farblose, (bis 260⁰) nicht schmelzende Blättchen, die in Alkohol mäßig leicht löslich waren. Aus ihren analytischen Daten konnte ich kein Resultat herausrechnen.

0,2460gr ergaben 0,6490gr CO₂ = 0,1770gr C = 75,64 % C und 0,1230gr H₂O = 0,0137gr H = 5,85 % H.

0,2340gr ergaben bei 744,4mm B. und 18⁰ C 30ccm N. = 14,84 % N.

Berechnet für:	für:	Gefunden:
C ₁₁ H ₁₁ N ₃	C ₁₁ H ₈ N ₂	
C ₁₁ : 132 : 71,35 %	C ₁₁ : 132 : 78,57 %	C = 75,64 %
H ₁₁ : 11 : 5,95 %	H ₈ : 8 : 4,76 %	H = 5,85 %
N ₃ : 42 : 22,7 %	N ₂ : 28 : 16,67 %	N = 14,84 %

Zum Vergleich habe ich noch die Zahlen für Cyannaphthylimid C₁₁H₈N₂ angegeben. Um die Beständigkeit des Körpers zu prüfen, der möglicher Weise ein Gemisch von Guanidin und Cyanimid war, erhitzte ich ihn längere Zeit für sich an der Luft auf 160⁰. Dabei blieb er unverändert und verlor nicht an Gewicht.

Verfuch II. Ich wiederholte den vorigen Versuch unter Fortlassung des Kalizufatzes, der möglicherweise die Reaction complizirt hatte. Es resultirte jedoch nur in geringer Ausbeute ein ganz verharztes Product, aus dem sich keine Krystalle gewinnen ließen. Wiederholte Darstellung lieferte kein besseres Resultat. Allmählich, nach häufigem Lösen in Alkohol, schied sich ein etwas besser aussehender Körper aus, jedoch in so geringer Menge, daß die Analyse desselben nicht möglich

¹⁾ Cofiner, Berichte deutsch. chem. Gef. XIV, 61.

war. Ich vermuthe, daß das Harz, welches sich gegen Säuren ziemlich passiv verhielt, Naphtylcyanimid und der daraus entstandene Körper fein Polymeres, das Trinaphtylmelamin war.

Versuch III. Es war nicht unmöglich, daß, wenn ich Quecksilberchlorid zur Entschwefelung anwandte (vgl. die Analogie bei Bernthsen, f. o. Seite 15), sich dieses mit Ammoniak zu einer Amidverbindung, dem unschmelzbaren weissen Präcipitat NHgH_2Cl verbande und dadurch der Proceß in gewünschter Weise verlief. Allein auch hier wurde nur wieder eine sehr geringe Ausbeute erzielt und das Product liefs sich — selbst durch Darstellung des Chlorhydrates — nicht in eine brauchbare Form bringen. Es resultirten nur sehr schmutzige, weisse Kryalle, deren Reinigung durch UmkrySTALLISIREN aus Alkohol nicht gelang.

Vielleicht wäre die Durchführung dieser Reaction möglich, wenn man den Präcipitat fertig gebildet anwendete. Es ist jedoch zu empfehlen, dann zunächst in niederen Reihen zu arbeiten, da die Naphtalinkörper wenig geeignet sind zum Studium dieser Reaction; der Sulfoharnstoff ist zu schwer löslich. Deshalb war auch der folgende

Versuch IV vergeblich. Da vielleicht die Hitze schädlich gewirkt hatte schüttelte ich den Sulfoharnstoff mit frisch gefälltem Quecksilberoxyd und alkoholischem Ammoniak mehrere Stunden lang und nach 2tägigem Stehen von Neuem. Eine Entschwefelung war zwar eingetreten; ein Product konnte nicht gefafst werden.

Versuch V. Bekanntlich reagiren die Imidoäther leicht mit Ammoniak und Aminen. Es war deshalb zu hoffen, daß der Naphtylcarbaminthioäther bei geeigneter Behandlung mit Ammoniak das gewünschte Guanidin geben werde. Ich stellte jenen deshalb dar, indem ich Jodaethyl auf den Thioharnstoff einwirken liefs. Es bildete sich mit Leichtigkeit das jodwasserstoffsaure Salz des Aethers, aus dem durch Natriumcarbonat dieser selbst isolirt wurde. Er spaltete schon bei

gewöhnlicher Temperatur ziemlich stark Mercaptan ab und wurde deshalb schnell weiter verarbeitet, indem er in alkoholischem Ammoniak gelöst und darin Stunden lang lebhaft gekocht wurde. Fortwährend entwich Mercaptan. Aus der Flüssigkeit wurde aber wiederum nur ein Harz gewonnen, das nicht in eine brauchbare Form übergeführt werden konnte.

Vielleicht würde dieser Versuch gelingen, wenn man den Aether längere Zeit bei mäßiger Temperatur mit Ammoniak in Berührung erhält. Dazu fehlte mir leider die Zeit.

Versuch VI. Nach E. Erlenmeyer (f. o.) wollte ich dann das Mononaphtylguanidin aus Cyanamid und Naphtylaminchlorhydrat erreichen. Ich liefs deshalb diese Componenten 3 Wochen lang bei einer sehr hohen Zimmertemperatur ($20-40^{\circ}\text{C}$) in alkoholischer Lösung aufeinander wirken. Es zeigte sich aber auch dann, sogar nachdem ich das Gemisch einige Zeit lebhaft gekocht hatte, dass gar keine Reaction eingetreten war. Es liefs sich daraus alles Naphtylamin wieder gewinnen. Daselbe wurde an seinem ganzen Aussehen und Schmelzpunct erkannt.

Die Versuche zur Darstellung des „Mono β naphtylguanidin“ haben demnach kein positives Resultat ergeben.

Vorstehend beschriebene Experimentalarbeit wurde im Laufe des vorigen und Anfang dieses Jahres im Berliner Universitätslaboratorium auf Anregung und unter Leitung des Herrn Professor A. W. Hofmann ausgeführt.

München, S. S. 83.

